

PROBLEMAS EBAU EXTREMADURA (2017-2020)

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES



MARÍA TERESA BATALLA CALVÍN
Academia Biblos

ÍNDICE

1	PROGRAMACIÓN LINEAL.....	1
1.1	Junio 2017	1
1.2	Julio 2017	1
1.3	Junio 2018	1
1.4	Julio 2018	2
1.5	Junio 2019	2
1.6	Julio 2019	2
1.7	Junio 2020	3
1.7.1	Problema 1	3
1.7.2	Problema 2	3
1.8	Septiembre 2020	3
1.8.1	Problema 1	3
1.8.2	Problema 2	4
2	MATRICES	5
2.1	Junio 2017	5
2.2	Julio 2017	5
2.3	Junio 2018	5
2.4	Julio 2018	6
2.5	Junio 2019	6
2.6	Julio 2019	6
2.7	Junio 2020	7
2.7.1	Problema 1	7
2.7.2	Problema 2	7
2.8	Septiembre 2020	7
2.8.1	Problema 1	7
2.8.2	Problema 2	7
3	FUNCIONES	9
3.1	Junio 2017	9
3.1.1	Opción A	9
3.1.2	Opción B.....	9
3.2	Julio 2017	10
3.2.1	Opción A	10
3.2.2	Opción B.....	10
3.3	Junio 2018	11
3.3.1	Opción A	11

3.3.2	Opción B.....	11
3.4	Julio 2018.....	11
3.4.1	Opción A.....	11
3.4.2	Opción B.....	12
3.5	Junio 2019.....	12
3.5.1	Opción A.....	12
3.5.2	Opción B.....	13
3.6	Julio 2019.....	13
3.6.1	Opción A.....	13
3.6.2	Opción B.....	13
3.7	Junio 2020.....	14
3.7.1	Problema 1.....	14
3.7.2	Problema 2.....	14
3.7.3	Problema 3.....	14
3.8	Septiembre 2020.....	15
3.8.1	Problema 1.....	15
3.8.2	Problema 2.....	15
3.8.3	Problema 3.....	15
4	PROBABILIDAD.....	16
4.1	Junio 2017.....	16
4.2	Julio 2017.....	16
4.3	Junio 2018.....	16
4.4	Julio 2018.....	17
4.5	Junio 2019.....	17
4.6	Julio 2019.....	18
4.7	Junio 2020.....	18
4.8	Septiembre 2020.....	18
5	ESTADÍSTICA.....	19
5.1	Junio 2017.....	19
5.2	Julio 2017.....	19
5.3	Junio 2018.....	19
5.4	Julio 2018.....	20
5.5	Junio 2019.....	20
5.6	Julio 2019.....	20
5.7	Junio 2020.....	21
5.7.1	Problema 1.....	21
5.7.2	Problema 2.....	21

5.8	Septiembre 2020	21
5.8.1	Problema 1	21
5.8.2	Problema 2	22
6	SOLUCIONES	23
6.1	Programación lineal	23
6.1.1	Programación Lineal Junio 2017	23
6.1.2	Programación Lineal Julio 2017	24
6.1.3	Programación Lineal Junio 2018	24
6.1.4	Programación Lineal Julio 2018	25
6.1.5	Programación Lineal Junio 2019	25
6.1.6	Programación Lineal Julio 2019	26
6.1.7	Programación Lineal Junio 2020 (1)	26
6.1.8	Programación Lineal Junio 2020 (2)	27
6.1.9	Programación lineal Septiembre 2020 (1)	27
6.1.10	Programación lineal Septiembre 2020 (2)	28
6.2	Matrices	29
6.2.1	Matrices Junio 2017	29
6.2.2	Matrices Julio 2017	30
6.2.3	Matrices Junio 2018	31
6.2.4	Matrices Julio 2018	32
6.2.5	Matrices Junio 2019	33
6.2.6	Matrices Julio 2019	34
6.2.7	Matrices Junio 2020 - Problema 1	35
6.2.8	Matrices Junio 2020 – Problema 2	36
6.2.9	Matrices Septiembre 2020- Problema 1	36
6.2.10	Matrices Septiembre 2020- Problema 2	37
6.3	Funciones	38
6.3.1	Funciones Junio 2017 – Opción A	38
6.3.2	Funciones Junio 2017 – Opción B	38
6.3.3	Funciones Julio 2017 – Opción A	39
6.3.4	Funciones Julio 2017 – Opción B	40
6.3.5	Funciones Junio 2018 – Opción A	41
6.3.6	Funciones Junio 2018-Opción B	42
6.3.7	Funciones Julio 2018 – Opción A	43
6.3.8	Funciones Julio 2018 – Opción B	44
6.3.9	Funciones Junio 2019 – Opción A	45
6.3.10	Funciones Junio 2019 – Opción B	45

6.3.11	Funciones Julio 2019 – Opción A.....	46
6.3.12	Funciones Julio 2019 – Opción B.....	46
6.3.13	Funciones Junio 2020 – Problema 1.....	47
6.3.14	Funciones Junio 2020 – Problema 2.....	47
6.3.15	Funciones Junio 2020 – Problema 3.....	48
6.3.16	Funciones Septiembre 2020– Problema 1.....	49
6.3.17	Funciones Septiembre 2020- Problema 2.....	49
6.3.18	Funciones Septiembre 2020 – Problema 3.....	50
6.4	Probabilidad.....	50
6.4.1	Probabilidad Junio 2017.....	50
6.4.2	Probabilidad Julio 2017.....	52
6.4.3	Probabilidad Junio 2018.....	54
6.4.4	Probabilidad Julio 2018.....	55
6.4.5	Probabilidad Junio 2019.....	56
6.4.6	Probabilidad Julio 2019.....	57
6.4.7	Probabilidad Junio 2020.....	58
6.4.8	Probabilidad - Septiembre 2020.....	60
6.5	Estadística.....	60
6.5.1	Estadística Junio 2017.....	60
6.5.2	Estadística Julio 2017.....	61
6.5.3	Estadística Junio 2018.....	62
6.5.4	Estadística Julio 2018.....	62
6.5.5	Estadística Junio 2019.....	63
6.5.6	Estadística Julio 2019.....	63
6.5.7	Estadística Junio 2020 – Problema 1.....	64
6.5.8	Estadística Junio 2020 – Problema 2.....	64
6.5.9	Estadística Septiembre 2020 – Problema 1.....	65
6.5.10	Estadística Septiembre 2020 – Problema 2.....	65
7	Guías de Supervivencia.....	66
7.1	Programación lineal.....	66
7.1.1	Modelo con tabla.....	66
7.1.2	Ejemplo sin tabla.....	68
7.2	Matrices.....	70
7.3	Funciones.....	73
7.3.1	Problemas del derecho.....	73
7.3.2	Problemas del revés.....	74
7.3.3	Apartado de determina la función.....	74

7.3.4	Integrales	75
7.3.5	Asíntotas	75
7.4	Probabilidad	76
7.4.1	Traducciones	76
7.4.2	Tablas de contingencia	76
8	Estadística	77
8.1	Muestreo.....	77
8.2	Estimación puntual	78
8.2.1	Para la media.....	78
8.2.2	Para la proporción	78
8.3	Intervalos de confianza	79
8.3.1	Para la media.....	79
8.3.2	Para la proporción	79
8.4	Tamaño muestral	79
8.4.1	Para la media.....	80
8.4.2	Para la proporción	80

Estos problemas han sido recopilados y resueltos por María Teresa Batalla Calvín, cualquier error o sugerencia podéis escribirme a ebau@academiabiblos.com.

Espero que os sirvan de ayuda para la preparación de la EBAU y para 2º de Bachillerato.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.



Atribución-No Comercial-No Derivadas

	Atribución (BY)	El beneficiario de la licencia tiene el derecho de copiar, distribuir, exhibir y representar la obra y hacer obras derivadas siempre y cuando reconozca y cite la obra de la forma especificada por el autor o el licenciente.
	No Comercial (NC)	El beneficiario de la licencia tiene el derecho de copiar, distribuir, exhibir y representar la obra y hacer obras derivadas para fines no comerciales.
	No Derivadas (ND)	El beneficiario de la licencia solamente tiene el derecho de copiar, distribuir, exhibir y representar copias literales de la obra y no tiene el derecho de producir obras derivadas.

Gracias Carlos

1 PROGRAMACIÓN LINEAL

1.1 Junio 2017

Una industria de productos lácteos produce crema de queso de oveja en envases de dos tamaños: pequeño de 100 gramos con un beneficio por envase de 0.50 euros y grande de 300 gramos con un beneficio par envase de 1.40 euros. Cada día dispone de 2400 kilogramos de crema de queso para envasar. Por razones de mercado el número de envases de 100 gramos producidos diariamente no puede ser mayor de 15000 y debe ser igual o superior al de envases de 300 gramos. Se pide, justificando las respuestas:

a) ¿Cuántos envases de cada tipo deben producirse diariamente para hacer máximos los beneficios?

b) ¿Cuáles serán dichos beneficios máximos?

[Solución](#)

1.2 Julio 2017

Un taller de confección textil produce dos categorías de trajes: de señora y de caballero. Dispone de material para fabricar diariamente 850 trajes de señora y 650 trajes de caballero. Si tiene que fabricar diariamente como máximo 1000 unidades totales y el beneficio obtenido por cada traje de señora es de 150 euros y de 200 euros por traje de caballero se pide:

a) ¿Cuántos trajes de cada tipo han de fabricarse diariamente para hacer máximo el beneficio?

b) El valor de dicho beneficio

[Solución](#)

1.3 Junio 2018

Una empresa vinícola produce dos tipos de vino, blanco y tinto. Por razones de comercialización, el número de botellas de vino blanco debe ser inferior al número de botellas de vino tinto y el máximo de botellas totales producidas no puede ser superior a 60000. Además, a causa de la mala cosecha de uva no pueden producirse más de 40000 botellas de vino tinto ni más de 25000 de vino blanco. Sabiendo que el beneficio obtenido por cada botella de vino tinto

es de 2.50 euros y de 3 euros por cada botella de vino blanco y que se vende toda la producción, se pide:

- ¿Cuántas botellas de cada tipo han de producirse para hacer máximos los beneficios?
- ¿Cuáles serán dichos beneficios máximos?

[Solución](#)

1.4 Julio 2018

Con el fin de incentivar sus ventas, un vivero de árboles frutales ofrece dos tipos de lotes: el lote A formado por 1 limonero, 1 naranjo y 1 manzano y el lote B por 2 limoneros y 1 manzano. Cada lote A le produce un beneficio de 30 euros y cada lote B un beneficio de 40 euros. Sabiendo que dispone como máximo de 1600 limoneros, 800 naranjos y 1000 manzanos, se pide:

- ¿Cuántos lotes de cada tipo han de ofrecer para hacer máximos los beneficios?
- ¿Cuáles serán dichos beneficios máximos?

[Solución](#)

1.5 Junio 2019

Una tienda de electrodomésticos desea adquirir, para su venta posterior, dos tipos de cocinas: vitrocerámicas y de inducción, disponiendo para ello de 3000 euros. Cada cocina vitrocerámica le cuesta 100 euros y cada cocina de inducción 200 euros. El almacén solo tiene espacio para un total de 20 cocinas. El beneficio obtenido por cada vitrocerámica es de 30 % de su precio de coste y el beneficio de cada cocina de inducción es del 25 % también sobre su precio de coste. Además, por razones de mercado el número de cocinas de inducción no puede ser superior a 12. Se pide determinar, justificando las respuestas:

- ¿Cuántas cocinas de cada tipo debe comprar para obtener el máximo beneficio?
- ¿Cuál es el valor de dicho beneficio?

[Solución](#)

1.6 Julio 2019

Un taller industrial fabrica dos clases de motores A y B. Cada motor de clase A requiere 2 horas de montaje y 1 hora de reglaje, con un beneficio de 220 euros y cada motor de clase B, 3 horas de montaje y 1/2 hora de reglaje con un beneficio de 280 euros.

Si solo se dispone cada día de 300 horas para el montaje de motores y de 120 horas para su reglaje y el número de motores de la clase B no puede ser superior a 80, se pide, justificando las respuestas:

- ¿Cuántos motores de cada clase se deben fabricar para obtener el máximo beneficio?
- ¿Cuál es el valor de dicho beneficio máximo?

[Solución](#)

1.7 Junio 2020

1.7.1 Problema 1

Una factoría de automóviles tiene pedidos de 180 turismos y 140 furgonetas para la próxima temporada. Dispone para ello de dos fábricas A y B. La fábrica A produce diariamente 6 turismos y 2 furgonetas con un coste diario de 30000 euros y la fábrica B 2 turismos y 2 furgonetas con un coste de 20000 euros cada día. ¿Cuántos días debe abrir cada fábrica para producir el pedido de la temporada con el mínimo coste? ¿Cuál es el valor de dicho coste mínimo? Justificar las respuestas.

[Solución](#)

1.7.2 Problema 2

Un apicultor hurdano tiene 900 botes de miel y 500 botes de polen con los que elabora dos lotes A y B que pone a la venta. Cada lote A contiene 2 botes de miel y 2 botes de polen con un beneficio de 15 euros y cada lote B 3 botes de miel y 1 bote de polen con un beneficio de 12 euros. ¿Cuántos lotes de cada tipo debe organizar para que el beneficio sea máximo? Halla el valor de dicho beneficio máximo. Justificar las respuestas.

[Solución](#)

1.8 Septiembre 2020

1.8.1 Problema 1

Una tienda de productos agrícolas dispone de 300 kg de abono de nitrógeno y de 80 kg de abono de potasio para la fabricación de dos compuestos A y B. Cada envase del compuesto A contiene 3 kilos de abono de nitrógeno y 1 kg de abono de potasio y cada envase del compuesto B contiene 6 kg de abono de nitrógeno y 1 kg de abono de potasio. Si el beneficio producido

por cada envase del compuesto A es de 100€ y el del envase del compuesto B es de 120€. ¿Cuántos envases de cada tipo debe fabricar para obtener el máximo beneficio? ¿Cuál será el valor de dicho beneficio?

[Solución](#)

1.8.2 Problema 2

Una tienda de artesanía de calzado fabrica zapatos y botas. Cada par de zapatos requiere 1 hora de trabajo y 0.5 m² de piel y cada par de botas 1 hora de trabajo y 1 m² de de piel, siendo el beneficio obtenido de 70€ por cada par de zapatos y de 80€ por cada par de botas. Si solo dispone de 50 horas de trabajo y de 35 m² de piel, ¿cuántos pares de zapatos y botas hay que fabricar para obtener los máximos beneficios?

[Solución](#)



2 MATRICES

2.1 Junio 2017

Sean A y B las matrices siguientes:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \quad y \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

- Hallar las matrices inversas de A y de B
- Comprobar que $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$
- Hallar la matriz X que verifique $A \cdot X = B$

[Solución](#)

2.2 Julio 2017

Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \\ 4 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

- Determinar si existen las matrices inversas de A y B. En caso afirmativo, calcularlas.
- Resolver la ecuación matricial $A \cdot X + B = I$

[Solución](#)

2.3 Junio 2018

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad y \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Hallar la matriz X que verifique $A \cdot X - B = B \cdot X + A$

[Solución](#)

2.4 Julio 2018

Sea la matriz

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Determina la matriz X Solución de la ecuación matricial $A \cdot X + A^2 = 2 A$
- Hallar la matriz inversa de A

[Solución](#)

2.5 Junio 2019

Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad y \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \\ x & 1 \end{pmatrix}$$

Se pide, justificando las respuestas:

- Determinar para qué valor del parámetro x no existe $(A \cdot B)^{-1}$
- Hallar la matriz inversa de $A \cdot B$ para $x=1$

[Solución](#)

2.6 Julio 2019

Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad e \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Halla el valor de b para el que no existe la matriz inversa de A
- Para $b=1$, hallar la matriz X que verifique que $A \cdot X = A^3 - I$

[Solución](#)

2.7 Junio 2020

2.7.1 Problema 1

Sean A y B las matrices siguientes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Hallar justificando la respuesta, las matrices X e Y que sean Solución del sistema de ecuaciones matriciales siguiente:

$$\left. \begin{array}{l} -2X + Y = A + B \\ 5X + Y = A - 2B \end{array} \right\}$$

[Solución](#)

2.7.2 Problema 2

Sea A la matriz siguiente:

$$A = \begin{pmatrix} x & 1 \\ -1 & x \end{pmatrix}$$

Hallar, justificando la respuesta, el valor de x para el que se verifica $A^t = A^{-1}$, donde A^t es la matriz traspuesta de A y A^{-1} es la matriz inversa de A

[Solución](#)

2.8 Septiembre 2020

2.8.1 Problema 1

Sean A, B e I las matrices siguientes

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Hallar, justificando la respuesta, la matriz X que sea solución de la ecuación matricial:

$$A \cdot B \cdot X = A \cdot B + I$$

[Solución](#)

2.8.2 Problema 2

Sean X, I y 0 las matrices siguientes:

$$X = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad 0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hallar, justificando la respuesta, los valores del parámetro a para los que se verifica:

$$X^2 - 4X + 3I = 0$$

[Solución](#)



3 FUNCIONES

3.1 Junio 2017

3.1.1 Opción A

El número de visitantes al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida en horario de mañana viene dado por la función:

$$V(t) = A - 2310t + Bt^2 - 10t^3, \quad 8 \leq t \leq 13$$

donde $V(t)$ denota el número de visitantes y t la hora (desde las 8 hasta las 13). Se sabe que el número máximo de visitantes se alcanza para $t = 11$ horas y que a las 12 horas el número de visitantes es 480. Se pide, justificando las respuestas:

- Determinar las constantes A y B
- Encontrar el número máximo de visitantes.
- Determinar si la función $V(t) / (t - 10)$ tiene alguna asíntota. En caso afirmativo, determínala.

[Solución](#)

3.1.2 Opción B

El número de empleados de una factoría de fabricación de automóviles varía a lo largo del año de acuerdo con la función:

$$N(t) = t^3 - 21t^2 + 99t + 1000, \quad 1 \leq t \leq 12$$

Siendo N el número de empleados y t los distintos meses del año. Se pide:

- ¿En qué meses del año se producen el máximo y el mínimo de empleados?
- Halla los valores de dichos máximo y mínimo.
- Representa de forma aproximada la función $N(t)$ en dicho periodo.

[Solución](#)

3.2 Julio 2017

3.2.1 Opción A

En el estudio en un laboratorio del tratamiento con antibióticos frente a una bacteria patógena durante 7 días, se ha encontrado que el número de bacterias vivas (en miles) a lo largo de estos 7 días ha variado de acuerdo con la función:

$$B(t) = -t^3 + 12t^2 - 36t + 80, \quad 1 \leq t \leq 7$$

Siendo B el número de bacterias vivas (en miles) y t el día de la realización del estudio. Se pide, justificando las respuestas:

- Determinar los días del estudio en los que se ha observado el número máximo y mínimo de bacterias vivas.
- Hallar los valores de dichos valores máximo y mínimo.
- Representar de forma aproximada la función B(t) a lo largo de los 7 días del estudio

[Solución](#)

3.2.2 Opción B

La demanda de un producto es función de su precio según la expresión:

$$D(x) = \begin{cases} Ax - x^2 & \text{si } 20 \leq x \leq 30 \\ 600 - Bx & \text{si } 30 < x \leq 60, \end{cases}$$

donde D denota la demanda en unidades y x el precio en euros. Se sabe que la demanda para $x=30$ es de 300 unidades y que la función es continua.

- Determinar las constantes A y B. Justificar las respuestas.
- Representar gráficamente la demanda en función de x.
- Comprobar si la función $D(x) / (x-25)$ tiene alguna asíntota. Encontrarla en caso afirmativo. Justificar la respuesta.

[Solución](#)

3.3 Junio 2018

3.3.1 Opción A

El consumo medio anual de combustible (en litros) por vehículo en Estados Unidos desde 1960 a 2000 se modeliza con la función

$$F(t) = 0,025t^3 - At^2 + Bt + 654 \quad 0 \leq t \leq 40$$

donde $F(t)$ es el número de litros y t el tiempo desde el año 1960. Se sabe que en el año 1970 ($t=10$) el consumo fue de 711.5 litros y en 1990 ($t=30$) el consumo fue de 526.5 litros.

- Determinar las constantes A y B . Justificar las respuestas
- Representar gráficamente el consumo medio de combustible en función del tiempo.

[Solución](#)

3.3.2 Opción B

Una empresa ha estimado que, al cabo de 10 años de funcionamiento, el balance de sus ingresos y gastos (en miles de euros), en función de los años transcurridos, ha sido el siguiente:

$$I(t) = -3t^2 + 62t, \quad 0 \leq t \leq 10$$

$$G(t) = t^2 - 10t + 120, \quad 0 \leq t \leq 10$$

donde I representa las ingresos y G , los gastos. Se pide, razonando las respuestas:

- La función que expresa el beneficio de la empresa.
- ¿Cuándo se obtiene el beneficio máximo? ¿A cuánto asciende?
- Calcular el área encerrada por la gráfica de la función $G(t)$ y el eje de abscisas en el intervalo $[0,5]$.

[Solución](#)

3.4 Julio 2018

3.4.1 Opción A

En el estudio realizado recientemente sobre cambio climático, por el grupo intergubernamental de expertos, se expusieron datos sobre la disminución del hielo ártico en los océanos. Una función que ajusta esos valores desde el año 1900 es la siguiente:

$$E(t) = \begin{cases} -1,6t^2 + At + 9656 & \text{si } 0 \leq t \leq 60 \\ 16400 - Bt & \text{si } 60 < t \leq 110 \end{cases}$$

donde E es la extensión de hielo ártico en los océanos en millones de km² y t el año de estudio. Se sabe que la función es continua y tiene un máximo en 1937 (t=37).

- Determinar las constantes A y B. Justificar la respuesta.
- Representar gráficamente la extensión del hielo ártico en los océanos en función del tiempo.

[Solución](#)

3.4.2 Opción B

En una urbanización se ha verificado durante un control que el consumo de agua en metros cúbicos, entre las 14 y las 21 horas, varía de acuerdo con la función:

$$C(t) = -4t^3 + 210t^2 - 3600t + 20400, \quad 14 \leq t \leq 21$$

Siendo C el agua consumida en metros cúbicos y t la hora de la realización del control.

Se pide justificando las respuestas:

- Determinar las horas de máximo y mínimo consumo de agua.
- Hallar los valores de dichos consumos máximo y mínimo.
- Calcular el área encerrada por la curva C y el eje de abscisas entre las 15 y las 20 horas.

[Solución](#)

3.5 Junio 2019

3.5.1 Opción A

Durante la crecida de un río, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha estimado que el caudal (en m³/s) ha variado durante las primeras 6 horas de acuerdo con la función:

$$C(t) = 2t^3 - 21t^2 + 60t + 20, \quad 0 \leq t \leq 6$$

Se pide, justificando las respuestas:

- Determinar las horas de máximo y mínimo caudal.
- Calcular dichos valores máximo y mínimo.
- Halla el área encerrada por la función C(t) y el eje OX entre los valores t = 3 y t = 5.

[Solución](#)

3.5.2 Opción B

El precio de cada acción de una determinada empresa oscila entre 2 y 8 euros. La facturación de dicha empresa en bolsa depende del precio de la acción y viene dada por la función:

$$F(x) = \begin{cases} 3 + Ax & \text{si } 2 \leq x \leq 5 \\ 53 + 2x + Bx^2 & \text{si } 5 < x \leq 8 \end{cases}$$

Siendo $F(x)$ la facturación de la empresa en bolsa (en miles de euros) y x el precio de la acción (en euros). Se sabe que para un precio de la acción de 5 euros la facturación es de 13 mil euros y que la función es continua. Se pide, justificando las respuestas:

- Determinar las constantes A y B .
- Calcular las asíntotas verticales de la función $F(x) / (x^2 - 3x - 4)$ en el intervalo $[2,5]$

[Solución](#)

3.6 Julio 2019

3.6.1 Opción A

La potencia requerida por la maquinaria eléctrica de una empresa durante las 10 horas de su funcionamiento viene dada por la expresión:

$$P(t) = -t^3 + 15t^2 - 48t + 50, \quad 0 \leq t \leq 10$$

donde t es el tiempo expresado en horas y $P(t)$ la potencia expresada en kilovatios (kw). Se pide, justificando las respuestas:

- Determinar a qué horas se producen el máximo y el mínimo de esta potencia.
- Calcular dichos valores máximo y mínimo.
- Calcular el área encerrada por la función $P(t)$ y el eje OX entre $t = 1$ y $t = 5$.

[Solución](#)

3.6.2 Opción B

En un cultivo de bacterias desarrollado durante 6 horas se produce cierta sustancia de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$S(t) = At^3 - 2Bt^2 + 5t, \quad 1 \leq t \leq 6$$

donde $S(t)$ es la cantidad de sustancia producida (en ml) y t el tiempo de desarrollo del

cultivo. Se sabe que la producción de la sustancia es mínima a las 5 horas, momento en el cual se inhibe la actividad bacteriana y la producción es de 0 ml.

- (a) Determinar las constantes A y B. Justificar las respuestas.
 (b) Calcular las asíntotas de la función $S(t) / (t^2(t-2))$ en el intervalo $(1, \infty)$

[Solución](#)

3.7 Junio 2020

3.7.1 Problema 1

El gasto G (en euros) por el consumo de energía eléctrica en un taller durante las 8 horas de funcionamiento varía de acuerdo con la función:

$$G(t) = 2t^3 - 27t^2 + 84t + 60 \quad (0 \leq t \leq 8)$$

donde t es el tiempo transcurrido en horas. Se pide, justificando las respuestas, determinar a qué horas se producen los gastos máximo y mínimo y los valores de dichos gastos máximo y mínimo.

[Solución](#)

3.7.2 Problema 2

En una piscina natural, el aumento de temperatura (en grados centígrados), x, ocasiona un aumento en la cantidad de algas en superficie (en kg), F(x). La relación entre ambas cantidades viene dada por la función:

$$F(x) = \begin{cases} 2Bx + 2A & \text{si } 0 \leq x \leq 3 \\ x^2 - 3Ax + 8B & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

Se sabe que para un aumento de 4 grados centígrados, se han recogido 12 kg de algas y que la función es continua. Determinar las constantes A y B. Justificar la respuesta.

[Solución](#)

3.7.3 Problema 3

Se pide, justificando las respuestas:

- (a) Hallar el área encerrada por la función $f(x) = x^2 + x - 2$ y el eje OX entre $x = 4$ y $x = 6$.
 (b) Calcular las asíntotas de la función $g(x) = \frac{-2x^2 - 1}{3(x^2 + x - 2)}$

[Solución](#)

3.8 Septiembre 2020

3.8.1 Problema 1

Durante el estudio de una medida del ruido R , expresado en decibelios, en un punto de una determinada ciudad se ha comprobado que varía con el tiempo, t , expresado en horas de acuerdo con la función:

$$R(t)=t^3-12t^2+36t+60 \quad (1 \leq t \leq 7)$$

Determinar, justificando las respuestas, en qué momentos se producen los valores máximo y mínimo de ruido. Calcular dichos valores máximo y mínimo.

[Solución](#)

3.8.2 Problema 2

Cierta levadura es utilizada en la masa del pan en una cantidad x entre 1 y 5 gramos. El crecimiento de la masa en el horno $F(x)$ viene determinado por la cantidad de levadura de acuerdo con la función

$$\begin{cases} BX+2A & \text{si } 1 \leq x < 3 \\ x^2+Ax-B & \text{si } 3 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

Se sabe que con 2 gramos de levadura la masa experimenta un crecimiento de 2 cm y que la función es continua. Determinar las constantes A y B . Justificar las respuestas

[Solución](#)

3.8.3 Problema 3

Se pide, justificando la respuesta:

(a) Hallar el área encerrada por la función $f(x)=x^2+3x+3$ y el eje OX entre $x=1$ y $x=3$

(b) Calcula las asíntotas de la función:

$$f(x)=\frac{-2x^2+3}{2(x^2+3x+2)}$$

[Solución](#)

4 PROBABILIDAD

4.1 Junio 2017

En la exposición de la Facultad de Ciencias, "Original o Réplica" hay 42 fósiles, 28 rocas y 36 metales. Se sabe que, de ellos, son originales 6 fósiles, 14 rocas y 20 metales.

- (a) Si escogemos al azar una pieza de la exposición, ¿cuál es la probabilidad de que sea un metal?
- (b) Si escogemos al azar una pieza de la exposición, ¿cuál es la probabilidad de que sea replica?
- (c) Si escogemos al azar una pieza de la exposición y es una réplica, ¿cuál es la probabilidad de que sea un fósil?

[Solución](#)

4.2 Julio 2017

Una región de bosques está dividida en 3 zonas A, B y C. Para el próximo verano la probabilidad de incendio en cada zona es de 0.1, 0.2 y 0.05 respectivamente. En cada zona solo puede producirse, como máximo, un incendio. Si consideramos que los incendios se producen de forma independiente entre las zonas:

- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que no haya ningún incendio?
- (b) ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente dos incendios?
- (c) Si se sabe que ha habido solo un incendio, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido en la zona A?

Justificar las respuestas

[Solución](#)

4.3 Junio 2018

Se está realizando un estudio sobre los turistas en cierta ciudad. Se sabe que el 60 % son europeos, el 30 % americanos y el resto asiáticos. El 70 % de los europeos son mujeres, el 50 % de los americanos son mujeres y el 30 % de los asiáticos son mujeres.

- (a) Si se selecciona un turista al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea una mujer americana?
- (b) Si se selecciona un turista al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea una mujer?
- (c) Si nos dicen que se ha seleccionado un turista y es mujer, ¿cuál es la probabilidad de que sea europea?

[Solución](#)

4.4 Julio 2018

Un fotógrafo aficionado hace copia de seguridad de sus imágenes en espacios virtuales. Tiene contratados tres servicios premium: Dropbox, Onedrive y Box. Por razones de espacio, cada imagen la incluye solamente en uno de ellos. En Dropbox tiene el 40 % de sus imágenes, el 30 % en Onedrive y el resto en Box. Cada imagen está etiquetada en uno de dos tipos posibles: 'Retratos' o 'Paisajes'. En Dropbox, el 25 % son retratos, en Onedrive el 60 % y en Box, el 90 %. El resto son paisajes.

- (a) Si escoge una imagen al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea retrato?
- (b) Si escoge una imagen al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea paisaje y esté en Box?
- (c) Si escoge una imagen al azar y es paisaje, ¿cuál es la probabilidad de que esté en Onedrive?

[Solución](#)

4.5 Junio 2019

En un bosque hay 50 abetos, 30 cipreses y 120 pinos. Una enfermedad provocada por una oruga afecta a 25 abetos, 9 cipreses y 48 pinos. Se pide, justificando las respuestas:

- (a) Calcular la probabilidad de que un pino elegido al azar esté infectado por la oruga.
- (b) Calcular la probabilidad de que un árbol elegido al azar esté infectado por la oruga.
- (c) Si se selecciona un árbol al azar y está infectado por la oruga, ¿cuál es la probabilidad de que sea un pino?

[Solución](#)

4.6 Julio 2019

En una bodega, el 50 % del vino que se fabrica es tinto, el 30 % blanco y el resto rosado. Una vez en las barricas se vuelve agrio el 5 % del vino tinto, el 10 % del vino blanco y el 7 % del vino rosado.

- (a) Calcular la probabilidad de que una barrica elegida al azar contenga vino blanco y que además dicho vino esté agrio.
- (b) Calcular la probabilidad de que una barrica de vino tinto contenga vino con buen sabor.
- (c) Si se selecciona al azar una barrica y el vino está agrio, ¿cuál es la probabilidad de que contenga vino tinto?

[Solución](#)

4.7 Junio 2020

Una biblioteca cuenta con 1000 socios, de los cuales 350 son jóvenes, 400 adultos y 250 mayores. Encuestados sobre la puesta en marcha de un nuevo servicio, se muestran favorables 210 jóvenes, 300 adultos y 125 mayores. Se pide, justificando las respuestas:

- (a) Calcular la probabilidad de que un adulto sea contrario a la puesta en marcha del servicio.
- (b) Calcular la probabilidad de que un socio elegido al azar sea favorable a la puesta en marcha del servicio.

[Solución](#)

4.8 Septiembre 2020

En Portugal, el 40% del café consumido es de la marca Delta, el 50% de la marca Sical y el 10% restante se lo reparten otras marcas. Delta utiliza la variedad arábica para el 70% de sus envases y la variedad robusta para el 30%, Sical utiliza arábica en el 40% de sus envases y robusta en el 60%. Las otras marcas de café utilizan ambas variedades en el 50% de sus envases. Se pide, justificando las respuestas:

- (a) Calcular la probabilidad de que un envase de café comprado en Portugal sea Sical y de la variedad arábica.
- (b) Calcular la probabilidad de que en un envase de café portugués se haya utilizado la variedad robusta.

[Solución](#)

5 ESTADÍSTICA

5.1 Junio 2017

Una empresa de franquicias ha observado que durante el último año los beneficios han disminuido. Sospecha que hay mala gestión de las tiendas. Realiza un estudio para comprobarlo y de 95 tiendas muestreadas, 28 de ellas tienen mala gestión.

- Calcular el intervalo de confianza al 95 % de la proporción de tiendas mal gestionadas.
- Si la empresa quiere que la longitud de intervalo sea 0.1, ¿cuántas tiendas debería muestrear?

[Solución](#)

5.2 Julio 2017

Para realizar el control de calidad en la fabricación de protectores de pantallas de dispositivos móviles se utiliza el intervalo de confianza al 99 % del grosor de los mismos. Se sabe que la distribución del grosor es una normal de desviación típica conocida de 0.1 mm. Una empresa quiere crear su intervalo de confianza y muestrea diez protectores con los siguientes grosores (en mm):

0.50 0.43 0.37 0.27 0.60 0.32 0.31 0.27 0.40 0.36

- Calcula el intervalo de confianza al 99% del grosor medio de los protectores.
- Para que el intervalo de confianza sea útil, su longitud debe ser 0,1. ¿Cuántos protectores necesita muestrear la empresa para obtener esa precisión?

[Solución](#)

5.3 Junio 2018

Una región agrícola se dedica a la producción de tomates. Durante este año se ha utilizado un nuevo abono y se quiere estimar la cantidad de tomate producido por hectárea. Se han muestreado 37 zonas y la producción media ha sido de 78 tn por hectárea. Se sabe que el número de tn por hectárea sigue una distribución normal con desviación típica 2.

- Calcular el intervalo de confianza al 95%

- (b) ¿Cuál debe ser el tamaño muestral para que el intervalo tenga una longitud de 0.5?
Justificar las respuestas.

[Solución](#)

5.4 Julio 2018

En una ciudad se desea estimar la proporción de hogares que reciclan sus envases de plástico. La ciudad está dividida en cuatro barrios (A, B, C y D) con 800, 2000, 1200 y 1000 hogares respectivamente. Se selecciona mediante muestreo estratificado con afijación proporcional una muestra de 400 hogares.

- (a) ¿Cuántos hogares de cada uno de los barrios se incluirán en la muestra?
(b) Si en el barrio B, 64 hogares de la muestra reciclan, ¿cuál es la estimación de hogares que reciclan en ese barrio?
(c) Proporcionar un intervalo de confianza al 95% para la estimación puntual anterior.
Justificar las respuestas.

[Solución](#)

5.5 Junio 2019

El tiempo, en horas, que tarda cierta compañía telefónica en hacer efectiva la portabilidad de un número de teléfono sigue una distribución normal con desviación típica 24 horas. Se pregunta a 100 clientes por el tiempo invertido en la portabilidad, obteniéndose una media de 36 horas. Se pide, justificando las respuestas:

- (a) Calcular el intervalo de confianza al 95 % para la media de tiempo que tarda dicha compañía en hacer efectiva la portabilidad.
(b) ¿Cuál debe ser el tamaño muestral para que el intervalo tenga una longitud de 5?

[Solución](#)

5.6 Julio 2019

Se realiza un estudio sobre el tiempo de reacción de los conductores ante un imprevisto. Se considera una población de 10000 conductores, de los cuales 5000 tienen una antigüedad superior a 10 años, 3000 tienen una antigüedad entre 3 y 10 años y el resto tienen una antigüedad inferior a los 3 años. Se selecciona una muestra de 500 conductores mediante muestreo

estratificado con afijación proporcional. Se pide, justificando la respuesta:

(a) ¿Cuántos conductores de cada uno de los estratos mencionados anteriormente se incluirán en la muestra?

(b) En los conductores con una antigüedad de menos de 3 años que resultan elegidos en la muestra, se observa que el tiempo medio de reacción es de 1.2 segundos. Supuesta que dicha variable tiene una distribución normal de desviación típica 0.3, proporcionar un intervalo de confianza al 95% para el tiempo medio de reacción de estos conductores.

[Solución](#)

5.7 Junio 2020

5.7.1 Problema 1

El peso de los libros de texto es una variable que sigue una distribución normal con una desviación típica de 72 gramos. Se toma una muestra de 36 libros, siendo su peso medio de 800 gramos. Calcular, justificando la respuesta, el intervalo de confianza al 95 % para el peso medio de los libros de texto.

[Solución](#)

5.7.2 Problema 2

Se pretende realizar un estudio sobre la renta mensual de las familias. Dicha variable sigue una distribución normal con una desviación típica 400 euros. Si deseamos obtener un intervalo de confianza al 95 % para la media de dicha variable, ¿cuántas familias tenemos que seleccionar (tamaño muestral) para que el intervalo tenga una longitud de 160 euros? Justificar la respuesta.

[Solución](#)

5.8 Septiembre 2020

5.8.1 Problema 1

Una marca de dulces realiza un control de calidad de sus productos, considerando el diámetro (en cm) de las galletas que produce. Dicha variable sigue una distribución normal con una desviación típica de 2 cm- Se eligen 100 galletas al azar de las producidas en la fábrica,

obteniéndose un diámetro medio de 8 cm. Calcular, justificando la respuesta, el intervalo de confianza al 95% para el diámetro medio de las galletas producidas por dicha marca.

[Solución](#)

5.8.2 Problema 2

Se realiza un estudio sobre el precio del pan en distintas tiendas, variable que se supone con una distribución normal de desviación típica 20 céntimos. Si deseamos obtener un intervalo de confianza al 95% para la media de dicha variable, ¿cuántas tiendas tenemos que visitar (tamaño muestral) para que el intervalo tenga una longitud de 10 céntimos? Justificar la respuesta.


[Solución](#)



6 SOLUCIONES


6.1 Programación lineal

6.1.1 Programación Lineal Junio 2017




[Volver](#)

6.1.2 Programación Lineal Julio 2017



[Volver](#)

6.1.3 Programación Lineal Junio 2018



[Volver](#)

6.1.4 Programación Lineal Julio 2018



[Volver](#)

6.1.5 Programación Lineal Junio 2019



[Volver](#)

6.1.6 Programación Lineal Julio 2019

	A	B	Total
Montaje	2	3	300
Reglaje	1	0,5	120

VARIABLES:

Motor tipo A: x
Motor tipo B: y

RESTRICCIONES:

$2x+3y \leq 300$
 $y \leq 80$
 $x+0,5y \leq 120$
 $x \geq 0$
 $y \geq 0$

FUNCIÓN OBJETIVO:

$Z = B(x,y) = 220x + 280y$


$$2x+3y=300$$

$$\begin{array}{r|l} x & y \\ \hline 0 & 100 \\ 150 & 0 \end{array}$$

$$x+0,5y=120$$

$$\begin{array}{r|l} x & y \\ \hline 0 & 240 \\ 120 & 0 \end{array}$$

REGIÓN FACTIBLE:



VÉRTICES:

A(0,0)
B(0,80)
C $\begin{cases} y=80 \\ 2x+3y=300 \end{cases} (30,80)$
D $\begin{cases} 2x+3y=300 \\ x+0,5y=120 \end{cases} (105,30)$
E(120,0)

VALORES DE LOS VÉRTICES:

$Z_A \rightarrow 0$ $Z_B \rightarrow 22400$ $Z_C \rightarrow 29000$ $Z_D \rightarrow 31500$ $Z_E \rightarrow 26400$

SOLUCIÓN:

- Debe fabricar 105 motores de tipo A y 30 motores del tipo B.
- El beneficio máximo será de 31500€

[Volver](#)

6.1.7 Programación Lineal Junio 2020 (1)

	Turismos	Furgonetas
A	2	3
B	1	0,5
Total	180	140

VARIABLES:

Días fábrica A: x
Días fábrica B: y

RESTRICCIONES:

$6x+2y \geq 180$
 $2x+2y \geq 140$

$x \geq 0$
 $y \geq 0$

FUNCIÓN OBJETIVO:

$Z = C(x,y) = 30000x + 20000y$

$$6x+2y=180$$

$$3x+y=90$$


$$\begin{array}{r|l} x & y \\ \hline 0 & 90 \\ 30 & 0 \end{array}$$

$$2x+2y=140$$

$$x+y=70$$

$$\begin{array}{r|l} x & y \\ \hline 0 & 70 \\ 70 & 0 \end{array}$$

REGIÓN FACTIBLE:



VÉRTICES:

A(0,90)
B $\begin{cases} 3x+y=90 \\ x+y=70 \end{cases} (10,60)$
C(70,0)

VALORES DE LOS VÉRTICES:

$Z_A \rightarrow 1800000$ $Z_B \rightarrow 1500000$ $Z_C \rightarrow 2100000$

SOLUCIÓN:

- Debe abrir 10 días la fábrica A y 60 días la fábrica B.
- El coste mínimo será 1500000€

[Volver](#)

6.1.8 Programación Lineal Junio 2020 (2)

	Miel	Polen
A	2	2
B	3	1
Total	900	500

VARIABLES:
Lotes tipo A: x
Lotes tipo B: y

RESTRICCIONES:
 $2x+3y \leq 900$
 $2x+1y \leq 500$
 $x \geq 0$
 $y \geq 0$

FUNCIÓN OBJETIVO:
 $Z = B(x,y) = 15x + 12y$

2x+3y=900

$$\begin{array}{r} x \ 14 \\ 0 \ 450 \\ 300 \ 0 \end{array}$$

2x+y=500

$$\begin{array}{r} x \ 19 \\ 0 \ 500 \\ 250 \ 0 \end{array}$$

REGIÓN FACTIBLE:

VÉRTICES:
A(0,0)
B(0,300)
C(150,200)
D(250,0)

VALORES DE LOS VÉRTICES:
 $Z_A = 0$ $Z_B = 3600$ $Z_C = 4650$ $Z_D = 3750$

SOLUCIÓN:
a) Debe organizar 150 lotes del tipo A y 200 del tipo B.
b) El beneficio máximo será de 4650€

[Volver](#)

6.1.9 Programación lineal Septiembre 2020 (1)

	Nitrogeno	Fosforo	Beneficio
Compuesto A	3	1	100
Compuesto B	6	1	120
Total	180	80	

VARIABLES:
Compuesto A: x
Compuesto B: y

RESTRICCIONES:
 $3x+6y \leq 180$
 $x+y \leq 80$
 $x \geq 0$
 $y \geq 0$

FUNCIÓN OBJETIVO:
 $Z = B(x,y) = 100x + 120y$

3x+6y=180

$$\begin{array}{r} x \ 15 \\ 0 \ 30 \\ 180 \ 0 \end{array}$$

x+y=80

$$\begin{array}{r} x \ 12 \\ 0 \ 80 \\ 80 \ 0 \end{array}$$

REGIÓN FACTIBLE:

VÉRTICES:
A(0,0)
B(0,30)
C(60,20)
D(80,0)

VALORES DE LOS VÉRTICES:
 $Z_A = 0$ $Z_B = 3600$ $Z_C = 8400$ $Z_D = 8000$

SOLUCIÓN:
a) Debe fabricar 60 envases del compuesto A y 20 compuesto B.
b) El beneficio máximo será de 8400€

[Volver](#)

6.1.10 Programación lineal Septiembre 2020 (2)

	Piel	Horas	Beneficio
Zapatos	0.5	1	70
Botas	1	1	80
Total	35	50	

VARIABLES:

Zapatos: x

Botas: y

RESTRICCIONES:

$$0.5x + 1y \leq 35$$

$$1x + 1y \leq 50$$

$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$


FUNCIÓN OBJETIVO:

$$Z = B(x, y) = 70x + 80y$$

$$\begin{array}{r} 0.5x + y = 35 \\ x \quad y \\ 0 \quad 35 \\ \hline 70 \quad 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x + y = 50 \\ x \quad y \\ 0 \quad 50 \\ \hline 50 \quad 0 \end{array}$$

REGIÓN FACTIBLE:



VÉRTICES:

$$A(0,0)$$

$$B(0,35)$$

$$C \begin{cases} 0.5x + y = 35 \\ x + y = 50 \end{cases} \begin{cases} x = 30 \\ y = 20 \end{cases}$$

$$D(50,0)$$

VALORES DE LOS VÉRTICES:

$$z_A = 0 \quad z_B = 2800 \quad z_C = 3700 \quad z_D = 3500$$

SOLUCIÓN:

a) Debe fabricar 30 zapatos y 20 botas.

b) El beneficio máximo será de 3700€

[Volver](#)

6.2 Matrices

6.2.1 Matrices Junio 2017

a) Calculamos la inversa usando la fórmula:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} Adj^t$$

Comprobamos que $|A|$ y $|B|$ sean distintos de 0.

$$|A| = 1 \text{ y } |B| = -1$$

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{menores}} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{adjuntos}} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{adjunta traspuesta}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{inversa}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{menores}} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{adjuntos}} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{adjunta traspuesta}} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{inversa}} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$b) A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -5 \\ 11 & -8 \end{pmatrix}$$

$$(A \cdot B)^{-1} \rightarrow \begin{pmatrix} 7 & -5 \\ 11 & -8 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{menores}} \begin{pmatrix} -8 & 11 \\ -5 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{adjuntos}} \begin{pmatrix} -8 & -11 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{adj}^t} \begin{pmatrix} -8 & 5 \\ -11 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{inversa}} \begin{pmatrix} 8 & -5 \\ 11 & -7 \end{pmatrix}$$

$$B^{-1} \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -5 \\ 11 & -7 \end{pmatrix}$$

Por tanto, se verifica que $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$

c) Como tenemos ya la inversa de A calculada, lo mejor es despejar la matriz X.

$$A \cdot X = B \rightarrow A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B \rightarrow X = A^{-1} \cdot B$$

$$X = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -7 & 4 \end{pmatrix}$$

[Volver](#)

6.2.2 Matrices Julio 2017

a) Para determinar si existen inversas de A y de B hemos de verificar el que determinante sea distinto de 0.

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -1$$

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \\ 4 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

Por tanto, podemos calcular la inversa de A pero no la de B:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} Adj^t$$

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{menores}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & -2 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{adj} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{adj^t} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{inv.} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$b) A \cdot X + B = I \rightarrow A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot (I - B) \rightarrow X = A^{-1} \cdot (I - B)$$

$$I - B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \\ 4 & -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ -4 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot (I - B) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ -4 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 1 & -2 \\ 5 & -1 & 3 \\ -14 & 4 & -10 \end{pmatrix}$$

[Volver](#)

6.2.3 Matrices Junio 2018

Muchos preferís hacer el problema haciendo sistemas de ecuaciones. Personalmente, prefiero la opción de despejar la matriz, pero vamos a resolverlo por ambos caminos:

$$A \cdot X - B = B \cdot X + A$$

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

(Truco para evitar colapsos de ecuaciones: hacer fila1*columna 1 y fila2*columna 1 y luego fila1*columna 2 y fila2*columna 2)

$$\left. \begin{array}{l} 2a + 1c - 1 = a + 2c + 2 \\ -1a + 1c - 2 = 2a + c - 1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} a - 1c = 3 \\ -3a = 1 \end{array} \left\} \begin{array}{l} a = -1/3 \\ c = -10/3 \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} 2b + 1d - 2 = b + 2d + 1 \\ -1b + 1d - 1 = 2b + d + 1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} b - 1d = 3 \\ -3b = 2 \end{array} \left\} \begin{array}{l} b = -2/3 \\ d = -11/3 \end{array}$$

$$X = \begin{pmatrix} \frac{-1}{3} & \frac{-2}{3} \\ \frac{-10}{3} & \frac{-11}{3} \end{pmatrix}$$

Por el método de la matriz inversa.

$$A \cdot X - B = B \cdot X + A \rightarrow A \cdot X - B \cdot X = A + B \rightarrow (A - B) \cdot X = (A + B) \rightarrow (A - B)^{-1} \cdot (A - B) \cdot X = (A - B)^{-1} \cdot (A + B) \rightarrow X = (A - B)^{-1} \cdot (A + B)$$

$$A - B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow |A - B| = -3$$

$$(A-B)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{menores}} \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{adjuntos}} \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{adj}^t} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{inversa}} \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A+B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X = (A-B)^{-1} \cdot (A+B) = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 10 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-1}{3} & \frac{-2}{3} \\ \frac{-10}{3} & \frac{-11}{3} \end{pmatrix}$$

[Volver](#)

6.2.4 Matrices Julio 2018

a) Despejamos la matriz X (aquí hacerlo por ecuaciones es mucho más laborioso, aún así, es posible hacerlo si vas haciendo fila1*columna1, fila2*columna1, fila3*columna1 y resuelves el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, luego lo mismo con la columna 2 y con la columna 3).

$$A \cdot X + A^2 = 2A \rightarrow A \cdot X = 2A - A^2 \rightarrow A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot (2A - A^2) \rightarrow X = A^{-1} \cdot (2A - A^2)$$

Calculamos la inversa de A mediante la fórmula:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{Adj}^t$$

$$|A| = -2$$

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{menores}} \begin{pmatrix} -2 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{adj}} \begin{pmatrix} -2 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{adj}^t} \begin{pmatrix} -2 & 0 & -2 \\ 4 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{inv.}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \\ -1 & \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} \end{pmatrix}$$

$$2A - A^2 \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & 3 & -2 \\ -2 & -3 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} -3 & -4 & 2 \\ -4 & -5 & 6 \\ 6 & 5 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \cdot (2A - A^2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \\ -1 & \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & -4 & 2 \\ -4 & -5 & 6 \\ 6 & 5 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

[Volver](#)

6.2.5 Matrices Junio 2019

a) Para determinar para qué valores de x no existe $(A \cdot B)^{-1}$ bastará con ver qué valores de x anulan el determinante $|A \cdot B|$

$$A_{2 \times 3} \cdot B_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \\ x & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 + 2x & 3 \\ -x & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -1 + 2x & 3 \\ -x & 1 \end{vmatrix} = -1 + 2x + 3x = 5x - 1 \rightarrow 5x - 1 = 0 \rightarrow x = \frac{1}{5}$$

$A \cdot B$ no tendrá inversa si:

$$x = \frac{1}{5}$$

b) Calcular la matriz inversa de $A \cdot B$ para $x=1$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$|A \cdot B| = 4$$

$$(A \cdot B)^{-1} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{menores}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{adjuntos}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{adj}^t} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{inversa}} \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(A \cdot B)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{-3}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

6.2.6 Matrices Julio 2019

a) Para ver para qué valor de b no existe inversa, hemos de ver qué valor anula el determinante de A

$$|A| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = (3 + 0 + 0) - (2b + 0 + 0) = 3 - 2b \rightarrow 3 - 2b = 0 \rightarrow b = 3/2$$

La matriz A no tendrá inversa si $b = 3/2$

b) Para $b=1$ hallar la matriz X que verifique $A \cdot X = A^3 - I$

Despejamos la ecuación:

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot (A^3 - I) \rightarrow X = A^{-1} \cdot (A^3 - I)$$

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 8 & 4 & 11 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 8 & 4 & 11 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 10 & 15 \\ 0 & 1 & 0 \\ 30 & 20 & 41 \end{pmatrix}$$

$$A^3 - I = \begin{pmatrix} 11 & 10 & 15 \\ 0 & 1 & 0 \\ 30 & 20 & 41 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 10 & 15 \\ 0 & 0 & 0 \\ 30 & 20 & 40 \end{pmatrix}$$

Calculamos la inversa de A :

$$|A| = 1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{menores}} \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 6 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{adj}} \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -6 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{adj}^t} \begin{pmatrix} 3 & -6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & - & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{inv.}} \begin{pmatrix} 3 & -6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 3 & -6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 & 10 & 15 \\ 0 & 0 & 0 \\ 30 & 20 & 40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 10 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 10 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

Nota: Hay un camino más corto de resolver este ejercicio, si pensamos así:

$$X = A^{-1} \cdot (A^3 - I) \rightarrow X = A^{-1} \cdot A^3 - A^{-1} \cdot I = A^{-1} \cdot A \cdot A^2 - A^{-1} = A^2 - A^{-1}$$

Recordemos que $A^{-1} \cdot A = I$ y que la identidad es el elemento neutro de la multiplicación.

$$X = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 8 & 4 & 11 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 10 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

[Volver](#)

6.2.7 Matrices Junio 2020 - Problema 1

(Ver [vídeo](#))

$$\left. \begin{array}{l} -2X + Y = A + B \\ 5X + Y = A - 2B \end{array} \right\} \text{Aplicamos el método de reducción para reducir la Y (E}_1 - \text{E}_2)$$

$$-7X = 3B \rightarrow X = \frac{-1}{7}(3B)$$

$$X = \frac{-1}{7} \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{7} & \frac{-3}{7} \\ 0 & \frac{3}{7} \end{pmatrix}$$

Personalmente, aunque ya podríamos hacer sustitución, prefiero hacer reducción para reducir la X pues si hemos cometido un error en la X lo vamos a arrastrar para la Y.

$$5E_1 + 2E_2$$

$$7Y = 7A + B \rightarrow Y = \frac{1}{7}(7A + B) = \frac{1}{7} \left(\begin{pmatrix} 7 & 35 \\ 0 & -21 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 6 & 36 \\ 0 & -22 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{6}{7} & \frac{36}{7} \\ 0 & \frac{-22}{7} \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} \frac{3}{7} & \frac{-3}{7} \\ 0 & \frac{3}{7} \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} \frac{6}{7} & \frac{36}{7} \\ 0 & \frac{-22}{7} \end{pmatrix}$$

[Volver](#)

6.2.8 Matrices Junio 2020 - Problema 2

(Ver [vídeo](#))

Para resolver este problema comenzaremos haciendo la matriz inversa de A

$$|A| = x^2 + 1$$

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} x & 1 \\ -1 & x \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{menores}} \begin{pmatrix} x & -1 \\ 1 & x \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{adjuntos}} \begin{pmatrix} x & 1 \\ -1 & x \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{adj}^t} \begin{pmatrix} x & -1 \\ 1 & x \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{inversa}} \frac{1}{x^2+1} \begin{pmatrix} x & -1 \\ 1 & x \end{pmatrix}$$

Queremos que se verifique:

$$A^t = A^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} x & -1 \\ 1 & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x}{x^2+1} & \frac{-1}{x^2+1} \\ \frac{1}{x^2+1} & \frac{x}{x^2+1} \end{pmatrix} \rightarrow \text{Igualando } (a_{11}=a_{11}) \text{ obtenemos: } x = \frac{x}{x^2+1} \rightarrow x^3+x=x \rightarrow x=0$$

Comprobamos que para ese valor se verifica el resto de los términos.

$$a_{12}: -1 = -1$$

$$a_{21}: 1 = 1$$

$$a_{22}: 0=0$$

El valor buscado, por tanto, es $x=0$

- **Hay un camino bastante más rápido y más fácil.**

Sabemos que $A^t = A^{-1}$ y sabemos que siempre se verifica que $A \cdot A^{-1} = I$, sustituyendo A^{-1} por A^t obtenemos que $A \cdot A^t = I$

$$\begin{pmatrix} x & 1 \\ -1 & x \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x & -1 \\ 1 & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x^2 + 1 & 0 \\ 0 & 1 + x^2 \end{pmatrix}$$

Por tanto $x^2 + 1 = 1$ de donde $x=0$

[Volver](#)

6.2.9 Matrices Septiembre 2020- Problema 1

Vamos a hacerlo despejando la X ya que es muy sencillo:

$$(A \cdot B)^{-1}(A \cdot B) \cdot X = (A \cdot B)^{-1}(A \cdot B + I)$$

$$X = (A \cdot B)^{-1}(A \cdot B + I)$$

Operamos:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

Calculamos la inversa:

$$|A \cdot B| = 10$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{menores}} \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -6 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{adjuntos}} \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{adj}^t} \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{inversa}} \frac{1}{10} \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$$

Calculamos $A \cdot B + I$

$$A \cdot B + I = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 8 & 6 \\ -3 & 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.6 \\ -0.3 & 1.4 \end{pmatrix}$$

[Volver](#)

6.2.10 Matrices Septiembre 2020- Problema 2

$$X = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad 0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$X^2 - 4X + 3I = 0$$

Tan solo tenemos que operar:

$$X^2 = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

$$4X = \begin{pmatrix} 4a & 0 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}$$

$$3I = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$X^2 - 4X + 3I = \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4a & 0 \\ 0 & 12 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 - 4a + 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a^2 - 4a + 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Tan solo tenemos que igualar los elementos $a_{1.1}$ de ambos miembros (el resto coincide)

$a^2 - 4a + 3 = 0$; Resolvemos la ecuación de segundo grado y obtenemos que
 $a_1=3$ y $a_2=1$

[Volver](#)

6.3 Funciones

6.3.1 Funciones Junio 2017 - Opción A

a) Sabemos que $V(12)=480$ y que $V'(11)=0$.

$$V'(t)=-2310+2Bt-30t^2$$

(Recomiendo empezar siempre sustituyendo en la derivada)

$$-2310+2B \cdot 11-30 \cdot 11^2=0 \rightarrow B=270$$

$$A-27720+144B-17280=480 \rightarrow A=6600$$

b) $V(t) = 6600 - 2310t + 270t^2 - 10t^3$

El propio enunciado nos dice que el máximo es en $t=11$, por tanto calculamos $V(11)$

El número máximo será $V(11)=550$

El número máximo de visitantes será de 550.

c) $f(x) = (6600 - 2310t + 270t^2 - 10t^3) / (t-10)$

No tiene asíntotas horizontales ni oblicuas. Podemos calcular asíntota vertical para $t=10$ (el valor que anula el denominador y que está dentro del dominio de la función [8,13])

$$\lim_{t \rightarrow 10^+} \frac{6600 - 2310t + 270t^2 - 10t^3}{t - 10} = +\infty$$

$$\lim_{t \rightarrow 10^-} \frac{6600 - 2310t + 270t^2 - 10t^3}{t - 10} = -\infty$$

Tiene asíntota vertical en $t=10$

[Volver](#)

6.3.2 Funciones Junio 2017 - Opción B

a) Para calcular el máximo y el mínimo hemos de calcular qué valores anulan la primera derivada y estudiar el signo de la segunda derivada.

$N'(t) = 3t^2 - 42t + 99 \rightarrow N'(t) = 0$. Resolviendo la ecuación de segundo grado (podemos simplificar para facilitar los cálculos $t^2 - 14t + 33 = 0$) tenemos que $t=3$ y $t=11$.

$N''(t) = 6t - 42 = 6 \cdot (t-7)$ $N''(3) = -24 < 0$ máximo relativo en $(3, N(3))$

$$N'(11)=24 > 0 \text{ mínimo relativo en } (11, N(11))$$

Cuando la función es de grado superior a dos, debemos de comprobar los valores extremos también para decidir cuál es el máximo o mínimo absoluto. Yo recomiendo meter la función en la calculadora y hacer una tabla de valores y así nos evitamos posibles errores de cálculo.

$$N(1) = 1^3 - 21 \cdot 1^2 + 99 \cdot 1 + 1000 = 1079$$

$$N(3) = 3^3 - 21 \cdot 3^2 + 99 \cdot 3 + 1000 = \mathbf{1135}$$


$$N(11) = 11^3 - 21 \cdot 11^2 + 99 \cdot 11 + 1000 = \mathbf{879}$$

$$N(12) = 12^3 - 21 \cdot 12^2 + 99 \cdot 12 + 1000 = 892$$

El valor máximo se produce en el mes de marzo y el valor mínimo en el mes de noviembre.

b) *El máximo de empleados es 1135 y el mínimo es de 879.*

c) Para representarla tenemos suficiente con los valores que hemos calculado.



[Volver](#)

6.3.3 Funciones Julio 2017 - Opción A

a) Para determinar el máximo y el mínimo veremos qué valores anulan la primera derivada y estudiaremos su signo en la segunda derivada.

$$B'(t) = -3t^2 + 24t - 36$$

Para resolver la ecuación podemos simplificarla $-t^2 + 8t - 12 = 0$ y obtenemos $t = 6$ y $t = 2$

Hacemos la segunda derivada y estudiamos el signo para $t=6$ y $t=2$.

$$B''(t) = -6t + 24 = -6(t-4)$$

$$B''(6) = -12 < 0 \text{ M\u00e1ximo relativo en } (6, B(6))$$

$$B''(2) = 12 > 0 \text{ M\u00ednimo relativo } (2, B(2))$$

Calculamos los valores de los extremos y los valores para $t=6$ y $t=2$ ([v\u00eddeo](#) para hacer la tabla con la calculadora)

$$B(1) = 55$$

$$B(2) = \mathbf{48}$$


$$B(6) = \mathbf{80}$$

$$B(7) = 73$$

El n\u00famero m\u00e1ximo de bacterias se produce el sexto d\u00eda y el m\u00ednimo el segundo d\u00eda

b) *El valor m\u00e1ximo ser\u00e1 de 80 mil bacterias y el m\u00ednimo de 48 mil bacterias.*

c) Para representarla nos basta con los valores que tenemos calculados:



[Volver](#)

6.3.4 Funciones Julio 2017 - Opci\u00f3n B

(Ver [v\u00eddeo](#))

a) Se sabe que la funci\u00f3n es continua y que para $x=30$ el valor es de 300 unidades. Por tanto:

$$\lim_{t \rightarrow 30^-} (Ax - x^2) = \lim_{t \rightarrow 30^+} (600 - Bx) = D(30)$$

Podemos igualar cada uno de los l\u00edmites laterales a 300.

$$A \cdot 30 - 30^2 = 300 \rightarrow \mathbf{A=40}$$

$$600 - B \cdot 30 = 300 \rightarrow \mathbf{B=10}$$

b) Para representarla calcularemos $D(20)$ y $D(60)$ la primera rama sabemos que es una

parábola abierta hacia abajo (podría ser de utilidad calcular el vértice para “visualizar” mejor la gráfica) y la segunda rama es una función afín decreciente, puesto que la pendiente es negativa.


$$D(x) = 40x - x^2 \text{ para } [20,30]$$

$$D(x) = 600 - 10x \text{ para } (30,60]$$

- $D(20)=400$; $D(60)=0$
- Vértice:

Podemos o bien derivar e igualar a cero o bien con la fórmula de siempre $x = \frac{-b}{2a}$

Vemos que $x=20$ es el vértice.



c) Comprobar si la función $D(x) / (x-25)$ tiene alguna asíntota.

- Asíntota vertical \rightarrow Calculamos los límites laterales en los valores que anulan el denominador, en este caso $x=25$

$$\circ \lim_{t \rightarrow 25^-} \left(\frac{40x - x^2}{x - 25} \right) = -\infty$$

$$\circ \lim_{t \rightarrow 25^+} \left(\frac{40x - x^2}{x - 25} \right) = \infty$$

Tiene asíntota vertical en $x=25$

- Asíntota horizontal \rightarrow No tiene
- Asíntota oblicua \rightarrow No tiene

[Volver](#)

6.3.5 Funciones Junio 2018 - Opción A

(Ver [vídeo](#))

a) Se sabe que en el año 1970 el consumo fue de 711.5 litros y en 1990 de 526.5 litros. Por tanto:

$$F(10) = 711.5 \rightarrow 0,025 \cdot 10^3 - A \cdot 10^2 + B \cdot 10 + 654 = 711.5$$

$$F(30) = 526.5 \rightarrow 0,025 \cdot 30^3 - A \cdot 30^2 + B \cdot 30 + 654 = 526.5$$

Operando nos quedaría:

$$-100A + 10B = 32.5$$

$$-900A + 30B = -802.5$$

Hacemos reducción $3E_1 - E_2$

Obtenemos

$$A = \frac{3}{2} \text{ y } B = \frac{73}{4}$$

b) Para representarla como no nos dice el problema ninguna información sobre el máximo y el mínimo, es recomendable calcularlos y calcular los valores extremos.

$$F(t) = 0.025t^3 - \frac{3}{2}t^2 + \frac{73}{4}t + 654$$

$$F'(t) = 0.075t^2 - 3t + \frac{73}{4}$$

Aproximadamente sale $t=7.5$ y $t=32.5$ que nos da una idea para dibujarla mejor.

$$F(0) = 654$$


$$F(7.5) = 717.05$$

$$F(10) = 711.5$$

$$F(30) = 526.5$$

$$F(32.5) = 520.95$$

$$F(40) = 584$$



[Volver](#)

6.3.6 Funciones Junio 2018-Opción B

a) Para obtener la función que expresa el beneficio de la empresa es tan sencillo como hacer

la resta de ambos polinomios (ingresos menos gastos).

$$B(t)=I(t)-G(t)= -3t^2+62t - (t^2-10t+ 120)=-4t^2+72t-120$$

b) El beneficio máximo será el vértice de la parábola, por lo que se podría hacer con la fórmula ($x=\frac{-b}{2a}$), pero es preferible hacerlo por derivadas.

$$B'(t)= -8t+72 = -8\cdot(t-9) \rightarrow B'(t)=0 \rightarrow t=9$$

$$B''(t)=-8 \rightarrow B''(9)=-8 < 0 \text{ Máximo } (9,B(9)).$$

Ya podemos afirmar que:

El beneficio máximo lo obtiene a los nueve años de funcionamiento.

Para calcular a cuánto asciende basta con calcular $B(9)= -4\cdot9^2+72\cdot9-120=204$

El beneficio máximo será de 204 miles de euros

c) Para calcular el área encerrada tendremos que hacer la integral definida entre $t=0$ y $t=5$

$$\int_0^5 (t^2 - 10t + 120) dx = \left| \frac{1}{3}t^3 - \frac{10}{2}t^2 + 120t \right|_0^5 = \left| \frac{1}{3}t^3 - 5t^2 + 120t \right|_0^5 = G(5)-G(0)=\frac{1550}{3}$$

Por lo que el área será de 516.67 u²

[Volver](#)

6.3.7 Funciones Julio 2018 - Opción A

a) Sabemos que la función es continua y que el máximo está en $t=37$. Por tanto, sabemos:

$$\lim_{t \rightarrow 60^-} (-1.6t^2 + At + 9656) = \lim_{t \rightarrow 60^+} (16400 - Bt) = E(60)$$

$$E'(37) = 0$$

Calculamos la derivada de la primera rama (es la que incluye en su dominio el 37)

$$E'(t)=-3.2t+A$$

$$-3.2\cdot37+A=0$$

$$\mathbf{A=118.4}$$

$$-1.6\cdot60^2+A\cdot60+9656=16400-B\cdot60$$

$$(-5760+7104+9556-16400)/(-60)=B$$


$$\mathbf{B=90}$$

b) Para representarla tenemos que intentar visualizar la gráfica previamente, la primera rama es una parábola abierta hacia abajo con un máximo en $t=37$ y la segunda rama es una función afín decreciente.

$$E(37)=11846.4$$

$$E(60)= 11000$$

$$E(110)=6500$$



[Volver](#)

6.3.8 Funciones Julio 2018 - Opción B

- a) Para calcular el consume máximo y mínimo hemos de calcular qué valores anulan la primera derivada y estudiar su signo en la segunda derivada.

$$C'(t) = -12t^2 + 420t - 3600 = 12(-t^2 + 35t - 300)$$

$C'(t) = 0$, resolviendo tenemos que $t = 15$ y $t = 20$. Estudiamos su signo en la segunda derivada.

$$C''(t) = 12(-2t + 35)$$

$$C''(15) = 60 > 0 \text{ mínimo relativo}$$

$$C''(20) = -60 < 0 \text{ máximo relativo}$$

Calculamos los valores para 15 y 20 y para los límites superior e inferior de la función:

$$C(14) = 184$$

$$C(15) = \mathbf{150}$$

$$C(20) = \mathbf{400}$$

$$C(21) = 366$$

El valor máximo lo alcanza a las 15 horas y el valor mínimo a las 20 horas.

- b) *El valor mínimo será de 150 m^3 y el valor máximo de 400 m^3*

- c) Para calcular el área basta con hacer la integral definida entre los valores 15 y 20.

$$\int_{15}^{20} (-4t^3 + 210t^2 - 3600t + 20400) = \left| -\frac{4}{4}t^4 + \frac{210}{3}t^3 - \frac{3600}{2}t^2 + 20400t \right|_{15}^{20} =$$

$$|-t^4 + 70t^3 - 1800t^2 + 20400t|_{15}^{20} = C(20) - C(15) = 88000 - 86625 = 1375 \text{ u}^2$$

[Volver](#)

6.3.9 Funciones Junio 2019 - Opción A

(Ver [vídeo](#))

- a) Para determinar el valor máximo y mínimo hemos de calcular qué valores anulan la primera derivada y estudiar su signo en la segunda derivada.

$$C'(t) = 6t^2 - 42t + 60 \rightarrow C'(t) = 6(t^2 - 7t + 10) \rightarrow C'(t) = 0 \rightarrow t = 5 \text{ y } t = 2$$

$$C''(t) = 6(2t - 7) \rightarrow C''(5) = 18 > 0 \text{ mínimo relativo} \rightarrow C''(2) = -18 < 0 \text{ máximo relativo.}$$

Calculamos los valores para $t=2$ y $t=5$ así como para los límites de la función

$$C(0) = 0$$

$$C(2) = 72$$

$$C(5) = 45$$

$$C(6) = 56$$

El valor máximo lo alcanza a la segunda hora y el valor mínimo a la quinta hora

- b) *El valor máximo será de $72 \text{ m}^3/\text{s}$ y el valor mínimo de $45 \text{ m}^3/\text{s}$*

- c) Para calcular el área encerrada basta con calcular la integral definida entre $t=3$ y $t=5$

$$\begin{aligned} \int_3^5 (2t^3 - 21t^2 + 60t + 20) dt &= \left[\frac{2}{4}t^4 - \frac{21}{3}t^3 + \frac{60}{2}t^2 + 20t \right]_3^5 \\ &= \left[\frac{1}{2}t^4 - 7t^3 + 30t^2 + 20t \right]_3^5 = C(5) - C(3) = \frac{575}{2} - \frac{363}{2} = \frac{212}{2} \\ &= 106 \text{ u}^2 \end{aligned}$$

[Volver](#)

6.3.10 Funciones Junio 2019 - Opción B

(Ver [vídeo](#))

- a) Se sabe que la función es continua y que $F(5)=13$, por tanto:

$$\lim_{t \rightarrow 5^-} (3 + Ax) = \lim_{t \rightarrow 5^+} (53 + 2x + Bx^2) = F(5)$$

Basta con igualar cada límite lateral al valor de la función en el punto 5.

$$3 + A5 = 13 \rightarrow \mathbf{A = 2}$$

$$53 + 2 \cdot 5 + B \cdot 5^2 = 13 \rightarrow \mathbf{B = -2}$$

- b) Para calcular las asíntotas verticales tenemos que ver qué valores anulan el denominador (no pertenecen al dominio).

$$x^2 - 3x - 4 = 0$$

$x = 4$ y $x = -1$. Como -1 no pertenece al intervalo que nos proporciona el problema, solo hemos de calcular la AV para $x=4$

$$\lim_{t \rightarrow 4^-} \left(\frac{3 + 2x}{x^2 - 3x - 4} \right) = -\infty$$

$$\lim_{t \rightarrow 4^+} \left(\frac{3 + 2x}{x^2 - 3x - 4} \right) = \infty$$

Tiene una asíntota vertical en $x=4$

[Volver](#)

6.3.11 Funciones Julio 2019 - Opción A

- a) Para calcular el máximo y el mínimo tenemos que calcular qué valores anulan la primera derivada y estudiar su signo en la segunda derivada.

$$P'(t) = -3t^2 + 30t - 48 = 3(-t^2 + 10t - 16) \rightarrow P'(t) = 0 \rightarrow t = 2 \text{ y } t = 8$$

$$P''(t) = 3 \cdot (-2t + 10) = 6 \cdot (-t + 5) \rightarrow P''(2) = 18 > 0 \text{ mínimo relativo} \rightarrow P''(8) = -18 \text{ máximo relativo}$$

Calculamos los valores de $t=2$ y de $t=8$ así como de los límites superior e inferior para verificar el máximo y el mínimo absoluto.

$$P(0) = 50 ; P(2) = 6 ; P(8) = 114 ; P(10) = 70$$

Hay un máximo de potencia a las ocho horas de funcionamiento y un mínimo a las dos horas.

- b) El valor de la potencia mínima es de 6 kw y el de la potencia máxima es 114 kw

- c) Para calcular el área encerrada basta con calcular la integral definida entre $t=1$ y $t=5$

$$\int_1^5 (-t^3 + 15t^2 - 48t + 50) = \left| \frac{-1}{4}t^4 + \frac{15}{3}t^3 - \frac{48}{2}t^2 + 50t \right|_3^5 = \left| \frac{-1}{4}t^4 + 5t^3 - 24t^2 + 50t \right|_3^5 = C(5) - C(3) = \frac{475}{4} - \frac{123}{4} = \frac{352}{4} = 88 \text{ u}^2$$

[Volver](#)

6.3.12 Funciones Julio 2019 - Opción B

- a) Se sabe que el mínimo se produce a las 5 horas y que su valor es de cero. Por tanto:

$$S'(5) = 0$$

$$S(5) = 0$$

$$S'(t) = 3At^2 - 4Bt + 5$$

$$3A \cdot 5^2 - 4B \cdot 5 + 5 = 0 \rightarrow \text{simplificamos entre 5} \rightarrow 15A - 4B = -1$$

$$A \cdot 5^3 - 2B \cdot 5^2 + 5 \cdot 5 = 0 \rightarrow \text{simplificamos entre 25} \rightarrow 5A - 2B = -1$$

Resolvemos el sistema por reducción ($E_1 - 3E_2$) y obtenemos

$$\mathbf{B=1 \text{ y } A=1/5}$$

- b) Vamos a calcular las asíntotas de la función que nos proporciona el enunciado

$$f(x) = \frac{0.2t^3 - 2t^2 + 5t}{t^2(t-2)}$$

- Asíntota vertical: Estudiamos los límites en los valores que anulan el denominador (no pertenecen al dominio), esto es, $t=0$ y $t=2$. Como $t=0$ no pertenece al dominio de la función solo lo estudiaremos en $t=2$

$$\circ \lim_{t \rightarrow 2^-} \left(\frac{0.2t^3 - 2t^2 + 5t}{t^2(t-2)} \right) = -\infty ; \lim_{t \rightarrow 2^+} \left(\frac{0.2t^3 - 2t^2 + 5t}{t^2(t-2)} \right) = +\infty$$

Tiene asíntota vertical en $t=2$

- Asíntota horizontal: Calculamos el límite de la función cuando $x \rightarrow \infty$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{0.2t^3 - 2t^2 + 5t}{t^2(t-2)} \right) = 0.2$$

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \left(\frac{0.2t^3 - 2t^2 + 5t}{t^2(t-2)} \right) = 0.2$$

Tiene asíntota horizontal en $t=1/5$

[Volver](#)

6.3.13 Funciones Junio 2020 - Problema 1

(Ver [vídeo](#))

a) Para calcular el máximo y el mínimo, veremos qué valores anulan la primera derivada y estudiaremos su signo en la segunda derivada.

$$G'(t) = 6t^2 - 54t + 84 = 6 \cdot (t^2 - 9t + 14) \rightarrow G'(t) = 0 \rightarrow t^2 - 9t + 14 = 0 \rightarrow t = 7 \text{ y } t = 2$$

$$G''(t) = 6 \cdot (2t - 9) \rightarrow G''(2) = -30 < 0 \text{ máximo relativo} \quad G''(7) = 30 > 0 \text{ mínimo relativo}$$

Calculamos los valores en los $t=2$ y $t=7$ (en la función original) así como en los límites superior e inferior del dominio de la función.

$$G(0) = 60$$

$$G(2) = 136$$

$$G(7) = 11$$

$$G(8) = 28$$

La hora en la que se produce el mínimo gasto es a la séptima hora de funcionamiento y dicho gasto es de 11€, la hora de máximo gasto es la segunda hora con un valor de 136€

[Volver](#)

6.3.14 Funciones Junio 2020 - Problema 2

a) Se sabe que la función es continua y que para $x=4$ el valor de $f(x)$ es 12. Por tanto

$$F(4)=12$$

$$\lim_{t \rightarrow 3^-} (2Bx + 2A) = \lim_{t \rightarrow 3^+} (x^2 - 3Ax + 8B) = F(3)$$

$$F(4)=12 \rightarrow 4^2 - 3A \cdot 4 + 8B = 12 \rightarrow \text{Simplificamos entre 4} \rightarrow 4 - 3A + 2B = 3 \rightarrow -3A + 2B = -1$$

$$\text{Igualamos límites} \rightarrow 2B \cdot 3 + 2A = 3^2 - 3A \cdot 3 + 8B \rightarrow 11A - 2B = 9$$

Resolvemos el sistema fácilmente por reducción (E1+E2) y obtenemos **A=1** y **B=1**

[Volver](#)

6.3.15 Funciones Junio 2020 - Problema 3

a) Para hallar el área encerrada primero comprobaremos el dominio de la función y vemos que el dominio de la función es $(-\infty, -2) \cup (-2, 1) \cup (1, \infty)$, como nos pide entre 4 y 6 podemos resolver la integral sin problema.

$$\int_4^6 (x^2 + x - 2) = \left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x \right]_4^6 = F(6) - F(4) = 78 - \frac{64}{3} = \frac{170}{3} u^2$$

b) Nos piden las asíntotas de la función:

$$g(x) = \frac{-2x^2 - 1}{3(x^2 + x - 2)}$$

- Asíntota vertical: Calculamos los valores que anulan el denominador.

Resolviendo la ecuación de segundo grado tenemos que $x=1$ y $x=-2$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \left(\frac{-2x^2 - 1}{3(x^2 + x - 2)} \right) = -\infty ; \lim_{x \rightarrow -2^+} \left(\frac{-2x^2 - 1}{3(x^2 + x - 2)} \right) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{-2x^2 - 1}{3(x^2 + x - 2)} \right) = \infty ; \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{-2x^2 - 1}{3(x^2 + x - 2)} \right) = -\infty$$


Tenemos asíntotas verticales en $x=1$ y $x=-2$

- Asíntota horizontal:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-2x^2 - 1}{3(x^2 + x - 2)} \right) = -\frac{2}{3} ; \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{-2x^2 - 1}{3(x^2 + x - 2)} \right) = -\frac{2}{3}$$

Tiene una asíntota horizontal en $y = -\frac{2}{3}$

- Asíntota oblicua: No tiene (asíntota horizontal y oblicua son excluyentes)



(Esbozo de la gráfica)

[Volver](#)

6.3.16 Funciones Septiembre 2020- Problema 1

Para calcular el máximo y el mínimo, veremos qué valores anulan la primera derivada y estudiaremos su signo en la segunda derivada.

$$R'(t) = 3t^2 - 24t + 36 = 3 \cdot (t^2 - 8t + 12) \rightarrow G'(t) = 0 \rightarrow t^2 - 8t + 12 = 0 \rightarrow t = 2 \text{ y } t = 6$$

$$R''(t) = 3 \cdot (2t - 8) \rightarrow R''(2) = -12 < 0 \text{ máximo relativo} \quad R''(6) = 12 > 0 \text{ mínimo relativo}$$

Calculamos los valores en los $t=2$ y $t=7$ (en la función original) así como en los límites superior e inferior del dominio de la función.

$$R(1) = 85$$

$$R(2) = 92$$

$$R(6) = 60$$

$$R(7) = 67$$

La hora en la que se produce el mínimo ruido es a la sexta hora y dicho gasto es de 60 decibelios, la hora de máximo ruido es la segunda hora con un valor de 90 decibelios.

[Volver](#)

6.3.17 Funciones Septiembre 2020- Problema 2

Sabemos que $f(2) = 2$ y que la función es continua, por tanto,

$$\lim_{t \rightarrow 3^-} (Bx + 2A) = \lim_{t \rightarrow 3^+} (x^2 + Ax - B) = F(3)$$

$$2B + 2A = 2 \rightarrow A + B = 1$$

$$3B + 2A = 9 + 3A - B \rightarrow -A + 4B = 9$$

Resolvemos el sistema reduciendo las aes (A) y obtenemos $5B = 10$, $B = 2$ y, por tanto, $A = -1$

[Volver](#)

6.3.18 Funciones Septiembre 2020 – Problema 3

(a) Para hallar el área encerrada primero comprobaremos el dominio de la función y vemos que el dominio de la función es $(-\infty, \infty)$ por lo que podemos resolver la integral sin problema.

$$\int_1^3 (x^2 + 3x + 3) = \left| \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 3x \right|_1^3 = F(3) - F(1) = \frac{63}{2} - \frac{29}{6} = \frac{80}{3} u^2$$

(b) Nos piden las asíntotas de la función:

$$f(x) = \frac{-2x^2 + 3}{2(x^2 + 3x + 2)}$$

- Asíntota vertical: Calculamos los valores que anulan el denominador.

Resolviendo la ecuación de segundo grado tenemos que $x=-1$ y $x=-2$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \left(\frac{-2x^2 + 3}{2(x^2 + 3x + 2)} \right) = -\infty ; \lim_{x \rightarrow -1^-} \left(\frac{-2x^2 + 3}{2(x^2 + 3x + 2)} \right) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \left(\frac{-2x^2 + 3}{2(x^2 + 3x + 2)} \right) = \infty ; \lim_{x \rightarrow -2^+} \left(\frac{-2x^2 + 3}{2(x^2 + 3x + 2)} \right) = -\infty$$

Tenemos asíntotas verticales en $x=-1$ y $x=-2$

- Asíntota horizontal:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-2x^2 + 3}{2(x^2 + 3x + 2)} \right) = -\frac{2}{2} = -1 ; \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{-2x^2 + 3}{2(x^2 + 3x + 2)} \right) = -\frac{2}{2} = -1$$

Tiene una asíntota horizontal en $y = -1$


- Asíntota oblicua: No tiene (asíntota horizontal y oblicua son excluyentes)

[Volver](#)

6.4 Probabilidad

6.4.1 Probabilidad Junio 2017

Elaboramos un diagrama de árbol que siempre ayuda a la resolución del problema.



También podíamos haber hecho una tabla de contingencia

	Original	Réplica	Totales
Fósiles	6	36	42
Rocas	14	14	28
Metales	20	16	36
Totales	40	66	106

(a) Si escogemos al azar una pieza de la exposición, ¿cuál es la probabilidad de que sea un metal?

1. Siguiendo el árbol.

$$P(M \cap O) = \frac{36}{106} * \frac{20}{36} = \frac{20}{106} = 0.1887 \rightarrow 18.87\%$$

2. Leyendo la tabla y aplicando Laplace (*casos favorables entre casos posibles*)

$$P(M \cap O) = \frac{20}{106} = 0.1887 \rightarrow 18.87\%$$

(b) Si escogemos al azar una pieza de la exposición, ¿cuál es la probabilidad de que sea replica?

1. Siguiendo el árbol (teorema de la probabilidad total)

$$P(\bar{O}) = P(F \cap \bar{O}) + P(R \cap \bar{O}) + P(M \cap \bar{O}) = P(F) \cdot P\left(\frac{\bar{O}}{F}\right) + P(R) \cdot P\left(\frac{\bar{O}}{R}\right) + P(M) \cdot P\left(\frac{\bar{O}}{M}\right)$$

$$P\left(\frac{\bar{O}}{M}\right) = \frac{42}{106} \cdot \frac{36}{42} + \frac{28}{106} \cdot \frac{14}{28} + \frac{36}{106} \cdot \frac{16}{36} = \frac{66}{106} = 0.6226 \rightarrow 62.26\%$$

2. Leyendo la tabla y aplicando Laplace.

$$P(R) = \frac{\text{total de réplicas}}{\text{total de piezas}} = \frac{66}{106} = 0.6226 \rightarrow 62.26\%$$

(c) Si escogemos al azar una pieza de la exposición y es una replica, ¿cuál es la probabilidad de que sea un fósil?

1. Aplicando el Teorema de Bayes

$$P\left(\frac{F}{\bar{O}}\right) = \frac{P(F \cap \bar{O})}{P(F \cap \bar{O}) + P(R \cap \bar{O}) + P(M \cap \bar{O})} = \frac{\frac{42}{106} \cdot \frac{36}{42}}{\frac{42}{106} \cdot \frac{36}{42} + \frac{28}{106} \cdot \frac{14}{28} + \frac{36}{106} \cdot \frac{16}{36}} = \frac{\frac{36}{106}}{\frac{66}{106}} = \frac{36}{66} = 0.54$$

Es decir, el 54.54%


2. Leyendo la tabla y aplicando Laplace

$$P\left(\frac{F}{\bar{O}}\right) = \frac{\text{total de fósiles que son réplicas}}{\text{total de réplicas}} = \frac{36}{66} = 0.54$$

[Volver](#)

6.4.2 Probabilidad Julio 2017

Elaboramos un diagrama de árbol que siempre ayuda a la resolución del problema.



(a) ¿Cuál es la probabilidad de que no haya ningún incendio?

Seguimos el árbol:

- $P(\bar{I}_A \cap \bar{I}_B \cap \bar{I}_C) = 0.9 \cdot 0.8 \cdot 0.95 = 0.684 \rightarrow \mathbf{68.4\%}$

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente dos incendios?

Seguimos las ramas que nos llevan a dos incendios

- $P(I = 2) = P(I_A \cap I_B \cap \bar{I}_C) + P(I_A \cap \bar{I}_B \cap I_C) + P(\bar{I}_A \cap I_B \cap I_C) = 0.1 \cdot 0.2 \cdot 0.95 + 0.1 \cdot 0.8 \cdot 0.05 + 0.90 \cdot 0.2 \cdot 0.05 = 0.032 \rightarrow \mathbf{3.2\%}$

(c) Si se sabe que ha habido solo un incendio, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido en la zona A?

Aplicaremos el Teorema de Bayes.

Calculo aparte la probabilidad de que haya solo un incendio.

$$P(I = 1) = P(I_A \cap \bar{I}_B \cap \bar{I}_C) + P(\bar{I}_A \cap I_B \cap \bar{I}_C) + P(\bar{I}_A \cap \bar{I}_B \cap I_C) \\ = 0.1 \cdot 0.8 \cdot 0.95 + 0.9 \cdot 0.2 \cdot 0.95 + 0.9 \cdot 0.8 \cdot 0.05 = 0.283$$


$$P\left(\frac{I_A}{I=1}\right) = \frac{P(I_A \cap \bar{I}_B \cap \bar{I}_C)}{P(I_A \cap \bar{I}_B \cap \bar{I}_C) + P(\bar{I}_A \cap I_B \cap \bar{I}_C) + P(\bar{I}_A \cap \bar{I}_B \cap I_C)} = \frac{0.1 \cdot 0.8 \cdot 0.95}{0.1 \cdot 0.8 \cdot 0.95 + 0.9 \cdot 0.2 \cdot 0.95 + 0.9 \cdot 0.8 \cdot 0.05} = 0.2686$$

Por tanto, la probabilidad es del 26.86%

[Volver](#)

6.4.3 Probabilidad Junio 2018

Elaboramos un diagrama de árbol siempre ayuda a la resolución del problema.



(a) Si se selecciona un turista al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea una mujer americana?

- $P(Am \cap M) = P(Am) \cdot P\left(\frac{M}{Am}\right) = 0.3 \cdot 0.5 = 0.15 \rightarrow \mathbf{15\%}$

(b) Si se selecciona un turista al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea una mujer?

- Siguiendo el árbol (teorema de la probabilidad total)

$$P(M) = P(E \cap M) + P(Am \cap M) + P(As \cap M) = P(E) \cdot P\left(\frac{M}{E}\right) + P(Am) \cdot P\left(\frac{M}{Am}\right) + P(As) \cdot P\left(\frac{M}{As}\right) = 0.6 \cdot 0.7 + 0.3 \cdot 0.5 + 0.1 \cdot 0.3 = 0.6 \rightarrow \mathbf{60\%}$$

(c) Si nos dicen que se ha seleccionado un turista y es mujer, ¿cuál es la probabilidad de que sea europea?

- Aplicando el Teorema de Bayes


$$P\left(\frac{E}{M}\right) = \frac{P(E \cap M)}{P(E \cap M) + P(Am \cap M) + P(As \cap M)} = \frac{0.6 \cdot 0.7}{0.6 \cdot 0.7 + 0.3 \cdot 0.5 + 0.1 \cdot 0.3} = 0.7$$

Por tanto, la probabilidad es del 70%

[Volver](#)

6.4.4 Probabilidad Julio 2018

Elaboramos un diagrama de árbol que siempre ayuda a la resolución del problema.



(a) Si escoge una imagen al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea retrato?

Siguiendo el árbol (teorema de la probabilidad total)

$$\bullet P(R) = P(D \cap R) + P(O \cap R) + P(B \cap R) = P(D) \cdot P\left(\frac{R}{D}\right) + P(O) \cdot P\left(\frac{R}{O}\right) + P(B) \cdot$$

$$P\left(\frac{R}{B}\right) = 0.4 \cdot 0.25 + 0.3 \cdot 0.6 + 0.3 \cdot 0.9 = 0.55 \rightarrow \mathbf{55\%}$$

(b) Si escoge una imagen al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que sea paisaje y esté en Box?

$$\bullet P(B \cap P) = P(B) \cdot P\left(\frac{P}{B}\right) = 0.3 \cdot 0.1 = 0.03 \rightarrow \mathbf{3\%}$$

(c) Si escoge una imagen al azar y es paisaje, ¿Cuál es la probabilidad de que este en Onedrive?

Aplicando el Teorema de Bayes


$$\bullet P\left(\frac{O}{P}\right) = \frac{P(O \cap P)}{P(D \cap P) + P(O \cap P) + P(B \cap P)} = \frac{0.3 \cdot 0.4}{0.4 \cdot 0.75 + 0.3 \cdot 0.4 + 0.3 \cdot 0.1} = \frac{0.12}{0.45} = \mathbf{0.2\bar{6}}$$

Por tanto, la probabilidad es del 26.67%

[Volver](#)

6.4.5 Probabilidad Junio 2019

Elaboramos un diagrama de árbol que siempre ayuda a la resolución del problema.



También podíamos haber hecho una tabla de contingencia

	Infectado Oruga	No infectado oruga	Totales
Abetos	25	25	50
Cipreses	9	21	30
Pinos	48	72	120
Totales	82	118	200

(a) Calcular la probabilidad de que un pino elegido al azar este infectado por la oruga.

1. Siguiendo el árbol. (Teorema de la probabilidad condicionada)

- $P\left(\frac{O}{P}\right) = \frac{48}{120} = 0.4 \rightarrow 40\%$

2. Leyendo la tabla y aplicando Laplace (*casos favorables entre casos posibles*)

- $P\left(\frac{O}{P}\right) = \frac{\text{Pinos infectados por la oruga}}{\text{total de pinos}} = 0.4 \rightarrow 40\%$

(b) Calcular la probabilidad de que un árbol elegido al azar este infectado por la oruga.

1. Siguiendo el árbol (teorema de la probabilidad total)

$$P(I) = P(A \cap I) + P(C \cap I) + P(P \cap I) = P(A) \cdot P\left(\frac{I}{A}\right) + P(C) \cdot P\left(\frac{I}{C}\right) + P(P) \cdot P\left(\frac{I}{P}\right) = \frac{50}{200} \cdot \frac{25}{50} + \frac{30}{200} \cdot \frac{9}{30} + \frac{120}{200} \cdot \frac{48}{120} = \frac{82}{200} = 0.41 \rightarrow \mathbf{41\%}$$

2. Leyendo la tabla y aplicando Laplace.

$$P(I) = \frac{\text{total de árboles infectados por la oruga}}{\text{total de árboles}} = \frac{82}{200} = 0.41 \rightarrow \mathbf{41\%}$$

(c) Si se selecciona un árbol al azar y está infectado por la oruga, ¿cuál es la probabilidad de que sea un pino?

1. Aplicando el Teorema de Bayes

$$P\left(\frac{P}{I}\right) = \frac{P(P \cap I)}{P(A \cap I) + P(C \cap I) + P(P \cap I)} = \frac{\frac{120}{200} \cdot \frac{48}{120}}{\frac{50}{200} \cdot \frac{25}{50} + \frac{30}{200} \cdot \frac{9}{30} + \frac{120}{200} \cdot \frac{48}{120}} = \frac{\frac{48}{200}}{\frac{82}{200}} = \frac{48}{82} = 0.\overline{58536}$$

2. Leyendo la tabla y aplicando Laplace


$$P\left(\frac{P}{I}\right) = \frac{\text{total de pinos infectados por la oruga}}{\text{total de infectados por la oruga}} = \frac{48}{82} = 0.\overline{58536}$$

Es decir, el 58.54%

[Volver](#)

6.4.6 Probabilidad Julio 2019

Elaboramos un diagrama de árbol que siempre ayuda a la resolución del problema.



- (a) Calcular la probabilidad de que una barrica elegida al azar contenga vino blanco y que además dicho vino esté agrio.

Siguiendo el árbol

- $P(B \cap A) = P(B) \cdot P\left(\frac{A}{B}\right) = 0.3 \cdot 0.1 = 0.03 \rightarrow 3\%$

- (b) Calcular la probabilidad de que una barrica de vino tinto contenga vino con buen sabor.

Leyendo directamente el árbol (teorema de la probabilidad condicionada)

- $P\left(\frac{A}{T}\right) = 0.95 \rightarrow 95\%$

- (c) Si se selecciona al azar una barrica y el vino está agrio, ¿cuál es la probabilidad de que contenga vino tinto?

Aplicando el Teorema de Bayes

- $P\left(\frac{T}{A}\right) = \frac{P(T \cap A)}{P(T \cap A) + P(B \cap A) + P(R \cap A)} = \frac{0.5 \cdot 0.05}{0.5 \cdot 0.05 + 0.3 \cdot 0.1 + 0.2 \cdot 0.07} = 0.3623$

Por tanto, la probabilidad es del 36.23%


[Volver](#)

6.4.7 Probabilidad Junio 2020

Elaboramos una tabla de contingencia con los datos del problema:

	Favorables	No favorables	Totales
Jóvenes	210	140	350
Adultos	300	100	400
Mayores	125	125	250
Totales	635	365	1000

O bien, un diagrama de árbol que siempre ayuda a la resolución del problema.



(a) Calcular la probabilidad de que un adulto sea contrario a la puesta en marcha del servicio.

1. Teorema de la probabilidad condicionada

- $P\left(\frac{\bar{F}}{A}\right) = \frac{100}{400} = 0.25 \rightarrow \mathbf{25\%}$

2. Directamente leyendo la tabla y aplicando Laplace

- $P\left(\frac{\bar{F}}{A}\right) = \frac{\text{total de adultos contrarios a la propuesta}}{\text{total de adultos}} = \frac{100}{400} = 0.25 \rightarrow \mathbf{25\%}$

(b) Calcular la probabilidad de que un socio elegido al azar sea favorable a la puesta en marcha del servicio.

1. Siguiendo el árbol (teorema de la probabilidad total)

- $$P(F) = P(J \cap F) + P(A \cap F) + P(M \cap F) = P(J) \cdot P\left(\frac{F}{J}\right) + P(A) \cdot P\left(\frac{F}{A}\right) + P(M) \cdot P\left(\frac{F}{M}\right) =$$

$$\frac{350}{1000} \cdot \frac{210}{350} + \frac{400}{1000} \cdot \frac{300}{400} + \frac{250}{1000} \cdot \frac{125}{250} = \frac{635}{1000} = 0.635 \rightarrow \mathbf{63.5\%}$$


2. Directamente con la tabla y aplicando Laplace

- $P(F) = \frac{\text{total de personas favorables}}{\text{total de personas}} = \frac{635}{1000} = 0.635 \rightarrow \mathbf{63.5\%}$

[Volver](#)

6.4.8 Probabilidad - Septiembre 2020

Elaboramos un diagrama de árbol



(a) Siguiendo el diagrama de árbol:

$$P(S \cap A) = P(S) \cdot P\left(\frac{A}{S}\right) = 0.5 \cdot 0.4 = 0.2$$

El 20% es la probabilidad de ser Sical de la variedad arábica

(b) Siguiendo el árbol (teorema de la probabilidad total)

$$P(R) = P(D \cap R) + P(S \cap R) + P(O \cap R) = P(D) \cdot P\left(\frac{R}{D}\right) + P(S) \cdot P\left(\frac{R}{S}\right) + P(O) \cdot P\left(\frac{R}{O}\right) = 0.4 \cdot 0.3 + 0.5 \cdot 0.6 + 0.1 \cdot 0.5 = 0.47$$

El 47% de probabilidad de que el café sea robusto

[Volver](#)

6.5 Estadística

6.5.1 Estadística Junio 2017

$$\hat{p} = \frac{28}{95} \quad n=95$$

(a) Intervalo de confianza al 95%

$$z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.960$$

Como n es menor que 100 entonces empleamos la fórmula:

$$\left(\hat{p} - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{4n}}, \hat{p} + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{4n}} \right)$$

$$\left(\frac{28}{95} - 1.960 \cdot \sqrt{\frac{1}{380}}, \frac{28}{95} + 1.960 \cdot \sqrt{\frac{1}{380}} \right)$$

$$(0.1942, 0.3953)$$

(b) Tamaño = 2 · Error

$$0.1 = 2 \cdot \text{Error}$$

$$\text{Error} = 0.1 / 2 = 0.05$$

Despejamos n de la fórmula del error:

$$\text{Error} = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot (1 - \hat{p})}{n}}$$

Despejamos n y tenemos

$$n \geq \frac{1}{\text{Error}^2} \cdot z_{\frac{\alpha}{2}}^2 \cdot \hat{p} \cdot (1 - \hat{p})$$

$$n \geq \frac{1}{0.05^2} \cdot 1.960^2 \cdot \frac{28}{95} \cdot \left(1 - \frac{28}{95} \right) = 319.42$$

Debe seleccionar 320 tiendas

[Volver](#)

6.5.2 Estadística Julio 2017

$N(\mu, 0.1)$

(a) Calculamos la media muestral (sumamos todos los datos y dividimos entre el número de datos) $\bar{x} = 0.383$

$$z_{\frac{\alpha}{2}} = 2.576$$

Calculamos el intervalo de confianza aplicando la fórmula:

$$\left(0.383 - 2.576 \cdot \frac{0.1}{\sqrt{10}}, 0.383 + 2.576 \cdot \frac{0.1}{\sqrt{10}} \right)$$

$$(0.3015, 0.4645)$$

(b) Tamaño = 2 Error \rightarrow Error = 0.05

$$\text{Error} = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Despejamos n

$$n \geq \left(z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\text{Error}} \right)^2$$

$$n \geq \left(2.576 \cdot \frac{0.1}{0.05} \right)^2 = 26.54$$

Debe seleccionar al menos 27 protectores

[Volver](#)

6.5.3 Estadística Junio 2018

$N(\mu, 2)$

(a) $\bar{x} = 78$; $n=37$; $z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.960$

Calculamos el intervalo de confianza aplicando la fórmula:

$$\left(78 - 1.960 \cdot \frac{2}{\sqrt{37}}, 78 + 1.960 \cdot \frac{2}{\sqrt{37}} \right) \rightarrow (77.36, 78.64)$$

(b) Tamaño = 2 Error \rightarrow Error = 0.25

$$\text{Error} = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\text{Despejamos n} \rightarrow n \geq \left(z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\text{Error}} \right)^2 \rightarrow n \geq \left(1.96 \cdot \frac{2}{0.25} \right)^2 \rightarrow n \geq 245.8624$$

El tamaño muestral debe ser de 246 zonas

[Volver](#)

6.5.4 Estadística Julio 2018

(a) Estamos ante un muestreo estratificado con afijación proporcional:

Tenemos en total 5000 hogares y queremos una muestra de 400 por tanto

$$\frac{400}{5000} = \frac{n_1}{800} = \frac{n_2}{2000} = \frac{n_3}{1200} = \frac{n_4}{1000}$$

$$\frac{400}{5000} \cdot 800 = n_1 \rightarrow n_1 = 64 \rightarrow 64 \text{ hogares del barrio A}$$

$$\frac{400}{5000} \cdot 2000 = n_2 \rightarrow n_2 = 160 \rightarrow 160 \text{ hogares del barrio B}$$

$$\frac{400}{5000} \cdot 1200 = n_3 \rightarrow n_3 = 96 \rightarrow 96 \text{ hogares del barrio C}$$

$$\frac{400}{5000} \cdot 1000 = n_4 \rightarrow n_4 = 80 \rightarrow 80 \text{ hogares del barrio D}$$

$$(b) \hat{p} = \frac{64}{160} = 0.4$$

(c) Como $n \geq 100$ empleamos la fórmula

$$z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.960$$

$$\left(0.4 - 1.96 \cdot \sqrt{\frac{0.4 \cdot (1-0.4)}{160}}, 0.4 + 1.96 \cdot \sqrt{\frac{0.4 \cdot (1-0.4)}{160}} \right)$$

$$(0.324, 0.476)$$

[Volver](#)

6.5.5 Estadística Junio 2019

$$N(\mu, 24)$$

$$(a) \bar{x} = 36 ; n=100 ; z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.960$$

Calculamos el intervalo de confianza aplicando la fórmula:

$$\left(36 - 1.960 \cdot \frac{24}{\sqrt{100}}, 36 + 1.960 \cdot \frac{24}{\sqrt{100}} \right) \rightarrow (31.296, 40.704)$$

$$(b) \text{Tamaño} = 2 \text{ Error} \rightarrow \text{Error} = 2,5$$

$$\text{Error} = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\text{Despejamos } n \rightarrow n \geq \left(z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\text{Error}} \right)^2 \rightarrow n \geq \left(1.96 \cdot \frac{24}{2.5} \right)^2 \rightarrow n \geq 354.04$$

El tamaño muestral debe ser de 355 clientes

[Volver](#)

6.5.6 Estadística Julio 2019

(a) Estamos ante un muestreo estratificado con afijación proporcional:

Tenemos en total 5000 hogares y queremos una muestra de 400 por tanto

$$\frac{500}{10000} = \frac{n_1}{5000} = \frac{n_2}{3000} = \frac{n_3}{2000}$$

$$\frac{500}{10000} \cdot 5000 = n_1 \rightarrow n_1 = 64 \rightarrow 250 \text{ conductores de antigüedad superior a diez años}$$

$$\frac{500}{10000} \cdot 3000 = n_2 \rightarrow n_2 = 150 \rightarrow 150 \text{ conductores de antigüedad entre tres y diez años}$$

$$\frac{500}{10000} \cdot 2000 = n_3 \rightarrow n_3 = 100 \rightarrow 100 \text{ conductores de antigüedad inferior a tres años}$$

(b) $N(\mu, 0.3)$

$$\bar{x} = 1.2 ; n=100 ; z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.960$$

Calculamos el intervalo de confianza aplicando la fórmula:

$$(1.2 - 1.960 \cdot \frac{0.3}{\sqrt{100}}, 1.2 + 1.960 \cdot \frac{0.3}{\sqrt{100}}) \rightarrow (1.141, 1.259)$$

[Volver](#)

6.5.7 Estadística Junio 2020 - Problema 1

$N(\mu, 72)$

$$\bar{x} = 800 ; n=36 ; z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.960$$

Calculamos el intervalo de confianza aplicando la fórmula:

$$(800 - 1.960 \cdot \frac{72}{\sqrt{36}}, 800 + 1.960 \cdot \frac{72}{\sqrt{36}}) \rightarrow (776.48, 823.52)$$

[Volver](#)

6.5.8 Estadística Junio 2020 - Problema 2

$N(\mu, 400)$

$$z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.960$$

$$\text{Tamaño} = 2 \text{ Error} \rightarrow \text{Error} = \text{Tamaño} / 2 \rightarrow \text{Error} = 80$$

$$\text{Error} = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\text{Despejamos } n \rightarrow n \geq \left(z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\text{Error}} \right)^2 \rightarrow n \geq \left(1.96 \cdot \frac{400}{80} \right)^2 \rightarrow n \geq 96.04$$

Hemos de seleccionar a 97 familias

[Volver](#)

6.5.9 Estadística Septiembre 2020 - Problema 1

$$N(\mu, 2)$$

$$\bar{x} = 8 ; n=100 ; z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.960$$

Calculamos el intervalo de confianza aplicando la fórmula:

$$(8-1.960 \cdot \frac{2}{\sqrt{100}} , 8+1.960 \cdot \frac{2}{\sqrt{100}}) \rightarrow (7.608.8.392)$$

[Volver](#)

6.5.10 Estadística Septiembre 2020 - Problema 2

$$N(\mu, 20)$$

$$z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.960$$

$$\text{Tamaño} = 2 \text{ Error} \rightarrow \text{Error} = \text{Tamaño} / 2 \rightarrow \text{Error} = 5$$

$$\text{Error} = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\text{Despejamos } n \rightarrow n \geq (z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\text{Error}})^2 \rightarrow n \geq (1.96 \cdot \frac{20}{5})^2 \rightarrow n \geq 61.4656$$

Hemos de seleccionar a 62 tiendas

[Volver](#)

7 Guías de Supervivencia

Estas guías de supervivencia pretenden explicar de una forma muy sencilla conceptos básicos para la resolución de ejercicios. Ojo, no se trata de una recopilación teórica matemática, más bien una guía “cutrecilla”, pero útil, para la realización de ejercicios.

7.1 Programación lineal

En la mayoría de los problemas se puede elaborar una tabla que facilita mucho el problema, pero si no la ves con claridad, no te emparanoies. Te propongo un modelo con tabla y otro sin.

7.1.1 Modelo con tabla

Vamos a coger un ejercicio de modelo para explicarlo, te pongo en rojo lo que te aconsejo que vayas escribiendo.

Una empresa farmacéutica produce vacunas contra la gripe y contra la neumonía en dos laboratorios: A y B. El laboratorio A produce diariamente 2000 dosis de vacunas contra la gripe y 2000 dosis contra la neumonía, con un coste diario de 8000 euros y el laboratorio B, 4000 dosis de vacunas contra la gripe y 1000 contra la neumonía, con un coste diario de 10000 euros. Si se recibe un pedido de 24000 dosis de vacunas contra la gripe y 18000 contra la neumonía, se pide, justificando las respuestas:

- a) *¿Cuántos días debe funcionar cada laboratorio para satisfacer el pedido con un coste mínimo?*
- b) *¿Cuál será el valor de dicho coste mínimo?*

0. Lo primero que hacemos es LEER LA PREGUNTA de *¿cuántos...?* porque ahí me dicen quién es x y quién es y . Si me dicen cuántos días debe funcionar cada laboratorio es que el laboratorio A es x y el laboratorio B es y . Si me hubieran dicho cuántas vacunas para la gripe y cuántas para la neumonía entonces esas serían la x y la y . Parece un detalle tonto, pero ayuda mucho.

1. Ahora hay que empezar a escribir: *Estamos ante un problema de programación lineal. Identificamos las variables y elaboramos una tabla que recoja los datos del problema.*

x → número de días que funciona el laboratorio A

y → número de días que funciona el laboratorio B

	Laboratorio A (x)	Laboratorio B (y)	Total
Gripe	2000 (x)	4000 (y)	24000
Neumonía	2000 (x)	1000 (y)	18000

2. Escribimos las restricciones a las que hay que ajustar el problema.

Para escribir las restricciones, aunque se verifica en el 90% de los problemas que maximizar es ($>$) y minimizar es ($<$), prefiero que os paréis y penséis.

En este caso... si me hacen un pedido de 24000 unidades y yo no puedo mandarle 24000 ¿le enviaría 23999 o 24001?, obviamente le mando de más, por lo que es mayor o igual (\geq). Y así una a una.

Después de eso, tan solo tienes que “leer” la tabla para escribirlas y añadir siempre $x \geq 0$ y $y \geq 0$ para limitarla al primer cuadrante.

$$2000x + 4000y \geq 24000 \rightarrow (\text{simplificamos}) \rightarrow 2x + 4y \geq 24 \text{ (se podría simplificar más, pero lo dejamos así)}$$

$$2000x + 1000y \geq 18000 \rightarrow (\text{simplificamos}) \rightarrow 2x + y \geq 18$$

$$x \geq 0 \quad y \geq 0$$


3. Función objetivo: **Nuestra función a minimizar es $Z = C(x, y) = 8000x + 10000y = 1000(8x + 10y)$**
4. Dibujamos usando tabla de valores: **Realizamos un gráfico para calcular la región factible, esto es, la región que satisface las restricciones del problema.**

$2x + 4y = 24$ Sacamos los puntos de corte $(0, 6)$ y $(12, 0)$ (línea roja)

$2x + y = 18$ Sacamos los puntos de corte $(0, 18)$ y $(9, 0)$ (línea verde)

Ahora hay que delimitar la región factible. Podéis colorear la zona que pertenece o la zona que no pertenece, en este caso está rayada la zona que NO pertenece. Cogemos un punto cualquiera (si se puede el $(0,0)$ mejor) y comprobamos si satisface o no la restricción. Por ejemplo el $(0,0)$ lo sustituimos en $2x + 4y \geq 24$ Quedaría $0 \geq 24$ como esto **no es cierto** quiere decir que el $0,0$ **no pertenece** a la región de aceptación por tanto marcamos esa zona.

(Resolución hecha con <https://www.zweigmedia.com/utilities/lpg/index.html>)



5. **Calculamos los vértices y sus valores en la función objetivo.** Resolvemos los sistemas que sean necesarios por el método de reducción.

Vertex	Lines through vertex	Value of objective
● $(8, 2)$	$2x + 4y = 24$ $2x + y = 18$	84000 Minimum
● $(12, 0)$	$2x + 4y = 24$ $y = 0$	96000
● $(0, 18)$	$2x + y = 18$ $x = 0$	180000

6. A la vista de los resultados, procedemos a responder las cuestiones que nos plantea el problema.
- a) ¿Cuántos días debe funcionar cada laboratorio para satisfacer el pedido con un coste mínimo?
El laboratorio A debe funcionar 8 días y el B 2 días.
- b) ¿Cuál será el valor de dicho coste mínimo?
El coste mínimo será de 84 000 €

7.1.2 Ejemplo sin tabla

Una empresa vinícola produce dos tipos de vino, blanco y tinto. Por razones de comercialización, el número de botellas de vino blanco debe ser inferior al número de botellas de vino tinto y el máximo de botellas totales producidas no puede ser superior a 60000. Además, a causa de la mala cosecha de uva no pueden producirse más de 40000 botellas de vino tinto ni más de 25000 de vino blanco. Sabiendo que el beneficio obtenido por cada botella de vino tinto es de 2.50 euros y de 3 euros por cada botella de vino blanco y que se vende toda la producción, se pide:

- (a) ¿Cuántas botellas de cada tipo han de producirse para hacer máximos los beneficios? (3 puntos)
- (b) ¿Cuáles serán dichos beneficios máximos? (0.5 puntos)

1. Identificamos variables

Botellas de vino tinto $\rightarrow x$

Botellas de vino blanco $\rightarrow y$

2. Restricciones que nos plantea el problema:

$$y \leq x$$

$$x + y \leq 60000 \quad x \leq 40000$$

$$y \leq 25\,000$$

$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$

3. Función objetivo para maximizar: $Z = B^o(x,y) = 2,5x + 3y$

4. Representamos


(la recta $y = x$ es la bisectriz del primer cuadrante)

Hacemos tablas de valores para los que necesitamos, tomando -siempre que sea posible- como referencia los puntos de cortes con los ejes, esto es, $x = 0$ e $y = 0$.

Coloreamos en este caso la región que **no** pertenece a nuestra solución para dar más claridad al dibujo, aunque generalmente se hace al contrario.

Por ejemplo, la ecuación $y \leq x$ cojo un punto al azar $(0, 25)$ y sustituyo (¿25 es menor que 0?) al ver que el punto no verifica la restricción ese punto **NO** pertenece a la región de aceptación por lo que rayo esa zona.

Yo normalmente me lío con los ceros (y vosotros también) por lo que le he quitado los ceros de los miles para simplificar la gráfica y las cuentas, pero no te olvides de luego responder bien.



5. Calculamos los vértices y sus valores en la función objetivo:

Vertex	Lines through vertex	Value of objective
● $(40, 20)$	$x + y = 60$ $x = 40$	160
● $(35, 25)$	$x + y = 60$ $y = 25$	162.5 Maximum
● $(25, 25)$	$-x + y = 0$ $y = 25$	137.5
● $(0, 0)$	$-x + y = 0$ $x = 0$	0
● $(40, 0)$	$x = 40$ $y = 0$	100

6. A la vista de los resultados, procedemos a responder las cuestiones que nos plantea el problema

(a) ¿Cuántas botellas de cada tipo han de producirse para hacer máximos los beneficios? (3 puntos)

Ha de producir 35 000 botellas de vino blanco y 25 000 botellas de vino tinto.

(b) ¿Cuáles serán dichos beneficios máximos? (0.5 puntos)

Dichos beneficios serán de 162 500€

7.2 Matrices

- Dimensión: *filas x columnas*
- Suma y resta: *Solo se pueden sumar/restar matrices de la misma dimensión.*
- Multiplicación: *Las columnas de la primera matriz deben coincidir con las filas de la segunda. La dimensión de la matriz resultante será filas de la primera matriz x columnas de la segunda.*
- Matriz traspuesta: *Consiste en cambiar las filas por las columnas. Esto es las filas escribirlas en columnas o las columnas en filas. (A')*
- Matriz identidad: *Es la que tiene en su diagonal principal tiene 1 y el resto son ceros. (I)*
- Despejar ecuaciones:
 - Os dejo algunos ejemplos (dos trucos, despejar como una ecuación normal, es decir, todo lo que tiene X a un lado y sacar factor común -si no hay nada es un 1, por tanto es I y si hay un número es ese número I y luego si la letra está por delante de la X al otro lado pasará por delante, si está por detrás pasará por detrás)
 - $AX=B$; $A \cdot A^{-1} \cdot X = A^{-1} \cdot B$; $X = A^{-1} \cdot B$
 - $XA=B$; $XA \cdot A^{-1} = B \cdot A^{-1}$; $X = B \cdot A^{-1}$
 - $AX=B+CX$; $AX - CX = B$; $(A-C)X=B$; $(A-C)^{-1} \cdot (A-C)X = (A-C)^{-1} \cdot B$
 - $AX=B+X$; $AX - X = B$; $(A-I)X=B$; $(A-I)^{-1} \cdot (A-I)X = (A-I)^{-1} \cdot B$
 - $AX=B+2X$; $AX - X = B$; $(A-2I)X=B$; $(A-2I)^{-1} \cdot (A-2I)X = (A-2I)^{-1} \cdot B$
 - $AX=XB$ hay que usar matrices de letras, no se puede con el método de la matriz inversa
- Matriz inversa: *Es aquella que verifica $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$*
 - *Para que una matriz tenga inversa su determinante tiene que ser distinto de 0.*
 - $|A| \neq 0$
 - *Para calcular la inversa se aplica la siguiente fórmula:*
 - $A^{-1} = \frac{1}{|A|} Adj^t$

- Algunos preferís crear una matriz (a b ...) y resolver sistema para calcular la inversa, es más largo, pero ...
- Ejemplo de matriz inversa paso a paso.
 - Matriz 2x2

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

a) Lo primero que hacemos es calcular el determinante (si el determinante es 0 no podemos calcular la inversa).

$$|A| = \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = (-3 \cdot 4) - (1 \cdot (-2)) = -12 + 2 = -10$$

b) Vamos a calcular los menores. Para calcular los menores hay que tachar la fila y la columna del elemento que estamos haciendo.

$$\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow M_{11} = 4; \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow M_{12} = -2; \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow M_{21} = 1; \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow M_{22} = -3$$

c) A continuación, los adjuntos. De forma informal podríamos decir que para calcular los adjuntos, si la suma de la fila y la columna es par no se cambia el signo, si es impar se cambia.

$$\begin{aligned} A_{11} &= 4 \\ A_{12} &= 2 \\ A_{21} &= -1 \\ A_{22} &= -3 \end{aligned}$$

d) Lo “montamos” y la trasponemos

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

e) Dividimos cada término por el determinante y ya tenemos la inversa

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -0.4 & 0.1 \\ -0.2 & 0.3 \end{pmatrix}$$

- Matriz 3x3

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 4 \end{pmatrix}$$

a) Calculamos el determinante

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= (2 \cdot 1 \cdot 4 + (-1) \cdot (-3) \cdot 0 + (-1) \cdot (-2) \cdot 0) - (0 \cdot 1 \cdot 0 + (-3) \cdot (-2) \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) \cdot 4) = -8$$

b) Calculamos los menores

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} = (1 \cdot 4) - ((-2) \cdot (-3)) = 2 - 6 = -2$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = (-1 \cdot 4) - ((0) \cdot (-2)) = -4$$

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} = (-1 \cdot (-3)) - ((0) \cdot (1)) = 3 - 0 = 3$$

$$M_{21} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} = (-1 \cdot 4) - (0 \cdot (-3)) = -4 - 0 = -4$$

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = (2 \cdot 4) - ((0) \cdot (0)) = 8$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} = (2 \cdot (-3)) - ((0) \cdot (-1)) = -6 - 0 = -6$$

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = (-1 \cdot (-2)) - (1 \cdot 0) = 2 - 0 = 2$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = (2 \cdot (-2)) - ((0) \cdot (-1)) = -4$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = (2 \cdot 1) - ((-1) \cdot (-1)) = 2 - 1 = 1$$

c) La “montamos”, calculamos los adjuntos y la trasponemos

$$\begin{pmatrix} -2 & -4 & 3 \\ -4 & 8 & -6 \\ 2 & -4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 4 & 3 \\ 4 & 8 & 6 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 4 & 2 \\ 4 & 8 & 4 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix}$$

d) Ya tenemos la inversa:

$$A^{-1} = \frac{1}{-8} \begin{pmatrix} -2 & 4 & 2 \\ 4 & 8 & 4 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.25 & -0.5 & -0.25 \\ -0.5 & -1 & -0.5 \\ -0.375 & -0.75 & -0.125 \end{pmatrix}$$

7.3 Funciones

Me gusta clasificar los problemas como “problemas del derecho” y “problemas del revés”. Los problemas del derecho serían aquellos en los que nos dan la función sin incógnitas y los del revés en los que nos piden que calculemos A, B ...

7.3.1 Problemas del derecho

- Si nos piden el crecimiento y decrecimiento:
 - Escribiremos teoría: *Para estudiar el crecimiento y el decrecimiento, estudiaremos el signo de la primera derivada.*
 - Igualamos la primera derivada a 0.
 - Nos dará una o dos soluciones (rara vez salen tres, las funciones suelen ser de grado tres o dos por lo que al derivar tendremos grado dos o grado uno).
 - Estudiamos el signo de cada uno de los trozos en los que la función nos ha quedado dividida (ojo, normalmente la función está acotada, cuando hagamos la rayita es muy importante que la acotemos).
 - Respondemos lo más exacto posible (si son meses y nos sale 3, diremos *marzo*, si son horas diremos de tal a cuál hora...).

Ejemplo:

$$C(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 1 \quad -4 \leq x \leq 2$$

$$C'(x) = 3x^2 + 6x - 9$$

$$C'(x) = 0$$

$$x = -3 \text{ y } x = 1$$



$[-4, -3]$ Cogemos por ejemplo $C'(-3.5) > 0$ Crece

$[-3, 1]$ Cogemos por ejemplo $C'(0) < 0$ Decrece

$[1, 2]$ Cogemos por ejemplo $C'(1.5) > 0$ Crece

La función es creciente de $[-4, -3] \cup [1, 2]$ y decreciente en $[-3, 1]$

- Si nos piden el máximo o el mínimo:

- Escribimos teoría: Para estudiar los máximos y mínimos de la función, veremos qué valores anulan la primera derivada y estudiaremos su signo en la segunda derivada.
 - Igualamos la primera derivada a cero.
 - Hacemos la segunda derivada.
 - Sustituimos los valores que me han dado de anular la primera derivada en la segunda derivada. Si este valor es positivo tendrá en ese punto un mínimo relativo, si es negativo un máximo relativo.
 - Calcularemos el valor de dichos puntos en la función **original** y calculamos también los valores de los puntos de acotación (los que me da el enunciado del problema). Responderemos en función de los resultados cuál es el máximo absoluto y el mínimo absoluto (en la mayoría de los problemas son los valores que nos ha dado al igualar la primera derivada a cero, pero en algunos casos no es así, por lo que hay que comprobar siempre).
 - Ver [Funciones Junio 2017 – Opción B](#)
- Si nos otra cosa: Normalmente será trabajar con la función original. Sustituir un valor, igualar a algo, etc. Lee bien lo que te pregunta, suele ser muy sencillo, pero tienes que pararte.

7.3.2 Problemas del revés

- Normalmente me dicen que para tal valor adquiere el valor de tanto. Por ejemplo “*en el año tres adquiere el valor de 2*”, eso se traduce en $F(3)=2$.
- Si nos dicen en el valor tal alcanza el máximo o el mínimo, nos están diciendo que en ese punto la primera derivada vale 0.
- Si nos dicen que en tal punto alcanza el valor máximo y es de tanto, estamos ante un 2×1 , esto es, con una misma frase nos dan doble información. Por ejemplo en el año tres adquiere el valor máximo de 2 unidades. $F'(3)=0$ y $F(3)=2$

(ver por ejemplo [Funciones Junio 2017 – Opción A](#))

7.3.3 Apartado de determina la función

En muchos problemas nos piden que determinemos una función. Se nos pueden plantear tres casos:

- Que nos pidan la función ingresos
- Que nos pidan la función beneficios
- Que nos pidan la función coste unitario/medio.

a) Si nos piden la función ingresos bastará con multiplicar la función que nos dan (que es el número de ...) por la variable.

Si las personas que acuden a un centro comercial en función del precio de la entrada es $N(x)=3x+7$ donde x denota el precio de la entrada. Determina la función ingresos $I(x)=N(x)\cdot x$
Si nos dan el pvp la función ingresos será pvp·unidades (x o la letra que nos digan)

b) La función beneficios siempre será ingresos menos costes (te lo suele decir el propio enunciado). Si nos dan las dos funciones, tan solo tendremos que restar polinomios y si no nos dan los ingresos calculamos nosotros la función ingresos.

c) La función coste unitario o medio es la que resulta de dividir la función que nos dan entre x (o la letrita que sea)

Si el coste de fabricar un modelo de bicicleta es $C(x)=24x^3+12x^2-20x$. Calcula la función que expresa el coste de producir cada bicicleta $C_m(x) = C(x) / x$; $C_m(x) = 24x^2+12x-20$

7.3.4 Integrales

Las integrales que nos ponen son muy sencillas, tan solo hay que aplicar la norma básica de integrar de sumar un grado y dividir por él.

Siempre van a ser integrales definidas, por lo que tendremos que calcular los extremos y restarlos.

$$\int_2^4 (5x^3 - 2x^2) dx = \left| \frac{5}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 \right|_2^4 = F(4) - F(2) = \frac{832}{3} - \frac{44}{3} = \frac{788}{3}$$

Si nos preguntan área encerrada, daremos el valor absoluto y añadiremos al resultado u^2 .

7.3.5 Asíntotas

- Asíntotas verticales: ($x=k$). Habrá que igualar a 0 el denominador y estudiar los límites laterales en ese punto para estudiar el signo del ∞ .
- Asíntotas horizontales: ($y=k$). Hay que hacer el límite de la función cuando $x \rightarrow \infty$ y $x \rightarrow -\infty$. Truco rápido: si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, no tiene AH, si el grado del denominador es mayor que el del numerador la AH será $y=0$, si los grados son iguales cogemos los coeficientes de los términos mayores del numerador y del denominador)
- Asíntotas oblicuas: ($y=mx+n$) Si tiene AH no tiene AO. Para que tenga AO el denominador tiene que ser justo un grado menos que el numerador. Existe una fórmula para calcularla, pero lo más cómodo y rápido es que hagas el cociente de polinomios (numerador entre denominador) y el cociente es la asíntota oblicua.

Si quieres hacer este ejercicio más completo puedes hacer un pequeño esbozo de la gráfica, pero no es necesario.

7.4 Probabilidad

La mayoría de los problemas se van a poder resolver elaborando un diagrama de árbol. OJO, el diagrama de árbol es una herramienta individual para el desarrollo posterior del ejercicio.

Es importante identificar si se trata de un árbol con sucesos dependientes o sucesos independientes.

- Sucesos dependientes: Me van a hablar de dos cosas, por ejemplo, ser hombre y ser mujer y hablar o no inglés, practicar un deporte u otro y aceptar o rechazar una propuesta... Estos son los más frecuentes.
 - Por ejemplo [Junio 2017](#)
- Sucesos independientes: Me hablan de una sola cosa, aprobar tres pruebas, producirse incendios, pasar controles ... (normalmente lo dice el propio enunciado). Observa que tienes que pasar todas las pruebas, estudiar todas las zonas o pasar todos los controles. En el anterior caso era o una prueba u otra o una zona u otra o un control u otro.
 - Por ejemplo [Julio 2017](#)

7.4.1 Traducciones

Puede parecer muy raro explicado así, pero si te fijas en los enunciados de los problemas cuadra perfectamente ;)

- Que sea tal y cual : Nos están pidiendo la intersección (rama por rama) \cap ([Julio 2018 b](#))
- Sabiendo que es tal que sea cual: Nos están poniendo una condición (limitándonos el denominador). $P(A/B)$ ([Julio 2018 c](#))
 - Teorema de Bayes
 - Teorema de la Probabilidad condicionada.
- Que sea tal (y la pregunta es relativa a la característica de la segunda rama). Nos estarán pidiendo el teorema de la probabilidad total ([Julio 2018 a](#))

7.4.2 Tablas de contingencia

Cuando me hablan de valores totales, resulta muy útil elaborar tablas de contingencia e ir respondiendo por ahí.

Ejemplo [Junio 2020](#)

8 Estadística

En este apartado hago especial hincapié en que no se trata de hacer un manual de estadística, sino que vamos a resumir los conceptos que son materia de examen. Ya tendréis oportunidad en el 90% de las carreras en adentraros en el maravilloso mundo de la estadística descriptiva y la inferencia estadística. En esta pequeña guía de supervivencia solo quiero dejaros claros algunos conceptos.

- Hay que diferenciar:

Población

En el enunciado dice “Se sabe”, “la media de una determinada” ...

Muestra

Los datos vienen después de decirte la palabra muestra

Según nos hablen de población o muestra cada parámetro se representa con una letra diferente (llama a las letras por su nombre $\mu = mu$ $\sigma = \text{sigma}$)

Población		Muestra
μ	Media	\bar{x}
σ	Desviación típica	s
σ^2	Varianza	s^2

El temario se ha reducido mucho y básicamente nos pueden pedir:

- Muestreo
- Estimación puntual
- Intervalos de confianza
- Tamaño muestral

8.1 Muestreo

Consiste en seleccionar una muestra representativa de la población. El tema de muestreo es muy amplio, pero nosotros nos vamos a centrar en el MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO. Puede ser con afijación igual o proporcional.

- Afijación igual: consiste en dividir el tamaño de la muestra entre el número de estratos, independientemente del tamaño que tenga cada uno.
- Afijación proporcional: el número de elementos de cada estrato dependerá de su tamaño.
 - Si nos dan el porcentaje de la muestra bastará con hacer el % de cada estrato.

Por ejemplo, tenemos una población dividida en cuatro grupos y en cada uno hay

1000,500,300 y 200 elementos y seleccionamos una muestra del 10% en cada estrato habrá 100, 50,30 y 20 (basta con hacer el 10% de cada uno de ellos. Os recomiendo que uséis la techa de la calculadora del % (en el = o en ANS) porque a veces cuando os dicen 5% o 1% os liais con los ceros).

- Si nos dan el tamaño de la muestra y tenemos que calcular el tamaño de cada estrato.

- $\frac{n}{N} = \frac{n_1}{N_1} = \frac{n_2}{N_2} = \dots = \frac{n_i}{N_i}$ La n es el tamaño de la muestra y la N el tamaño

de la población. De ahí deducimos que el tamaño de cada estrato será

- $\frac{\text{Tamaño de la muestra}}{\text{Tamaño de la población}} * \text{tamaño de nuestro estrato}$

Por ejemplo, tenemos una población dividida en cuatro grupos y en cada uno hay 1000,500,300 y 200 elementos y seleccionamos una muestra de 100 elementos. Vamos a calcular el número de elementos de cada estrato.

$$1000+500+300+200=2000$$

$$\frac{100}{2000} = \frac{n_1}{1000} = \frac{n_2}{500} = \frac{n_3}{300} = \frac{n_4}{200}$$

$$n_1=50$$

$$n_2=25$$

$$n_3=15$$

$$n_4=10$$

(Comprueba siempre que la suma de los cuatro estratos dé el tamaño de la muestra)

8.2 Estimación puntual

8.2.1 Para la media

- Si nos dan los datos bastará con hacer la media aritmética que conocemos de siempre.

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \text{ (traducción, sumar todos los datos y dividir entre el número de datos)}$$

- Si nos dan el intervalo en el que se encuentra la media, la media será el punto medio, esto

$$\text{es, [a,b] la } \bar{x} = \frac{a+b}{2}$$

8.2.2 Para la proporción

- No es más que hacer Laplace = $\frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$. Importante se representa \hat{p}

- Si nos dan el intervalo en el que se encuentra dicha proporción, la estimación puntual será el punto medio, esto es, la $\hat{p} = \frac{a+b}{2}$

8.3 Intervalos de confianza

El valor de $z_{\alpha/2}$ lo sacamos de la tabla que nos dan. Normalmente va a ser 95% (1.960), 90% (1.645) y 99% (2.576).

α	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0		2.576	2.326	2.170	2.054	1.960	1.881	1.812	1.751	1.695
0.1	1.645	1.598	1.555	1.514	1.476	1.440	1.405	1.372	1.341	1.311
0.2	1.282	1.254	1.227	1.200	1.175	1.150	1.126	1.103	1.080	1.058
0.3	1.036	1.015	0.994	0.974	0.954	0.935	0.915	0.896	0.878	0.860
0.4	0.842	0.824	0.806	0.789	0.772	0.755	0.739	0.722	0.706	0.690

8.3.1 Para la media

$$\text{I.C. } \left(\bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

8.3.2 Para la proporción

Siempre comprobaremos que

- $n \cdot \hat{p} \geq 5$
- $n \cdot (1 - \hat{p}) \geq 5$

Tendremos que tener en cuenta el tamaño de la muestra.

- Si n es mayor de 30 y menor o igual que 100 la fórmula a usar para el intervalo de confianza es:

$$\circ \left(\hat{p} - z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{1}{4n}}, \hat{p} + z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{1}{4n}} \right)$$

- Si n es mayor que 100

$$\circ \left(\hat{p} - z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot (1 - \hat{p})}{n}}, \hat{p} + z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot (1 - \hat{p})}{n}} \right)$$

8.4 Tamaño muestral

Normalmente me van a pedir el tamaño muestral para que el error o la longitud tenga un valor determinado. La relación entre el error y la longitud es que la longitud es dos veces el error.

$$\text{longitud} = 2 \cdot \text{error}$$

8.4.1 Para la media

$$Error = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Si despejamos la n:

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{error} \right)^2$$

8.4.2 Para la proporción

$$Error = z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot (1 - \hat{p})}{n}}$$

Si despejamos la n:

$$n \geq \frac{z_{\alpha/2} \cdot \hat{p} \cdot (1 - \hat{p})}{error^2}$$